

**TEMA 5: Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden: Sistemas Lineales**

9 de abril de 2002

---

1. SISTEMA LINEAL DE EDO CON COEFICIENTES CONSTANTES

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = A\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t), \quad A \in \mathbb{R}^{N \times N}, \mathbf{f}(t), \mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^N \quad (1)$$

Supondremos que  $A$  es diagonalizable, con valores propios  $\{\lambda_k\}_{k=1}^N$  y vectores propios  $\{\mathbf{y}_k\}_{k=1}^N : A\mathbf{y}_k = \lambda_k \mathbf{y}_k$ ,  $k = 1 \dots N$ .

Tres métodos de resolución. Cada uno tiene un interés especial según las características del problema que debamos resolver.

**1.1.  $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$  : Valores propios no degenerados.**

Interesa cuando: No cond. iniciales, i.e.,  $\mathbf{x}(t)$  en función de  $N$  ctes. arbitrarias  $\{c_k\}_{k=1}^N$ .

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^N c_i \exp(\lambda_i t) \mathbf{y}_i \quad (2)$$

**1.2.  $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$  :  $\mathbf{x}(t)$  en función de cond. iniciales  $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ .**

¿Cómo evoluciona el vector  $\mathbf{x}_0$ ?

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t A\mathbf{x}(s) ds$$

Sol.  $\times$  iteraciones (Picard):  $\mathbf{x}_{(n)}(t)$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{(0)}(t) &= \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x}_{(1)}(t) &= \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t A\mathbf{x}_{(0)}(s) ds = [I + A(t - t_0)] \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x}_{(2)}(t) &= \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t A\mathbf{x}_{(1)}(s) ds = \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t A[I + A(s - t_0)] \mathbf{x}_0 \\ &= \left[ I + A(t - t_0) + \frac{1}{2} A^2(t - t_0)^2 \right] \mathbf{x}_0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Solución:

$$\mathbf{x}(t) = \exp[A(t - t_0)] \mathbf{x}_0$$

$$\mathbf{1.3.} \quad \frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x} + \mathbf{f}(t).$$

$\mathbf{x}(t)$  en función de cond. iniciales. Sin perdida de generalidad:  $t_0 = 0$ . Sol.: “complementaria+particular”

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_c(t) + \mathbf{x}_p(t)$$

$$\frac{d\mathbf{x}_c}{dt} = A\mathbf{x}_c$$

$$\frac{d\mathbf{x}_p}{dt} = A\mathbf{x}_p + \mathbf{f}(t) \quad (3)$$

$$\mathbf{x}(t) = \exp[At] \left\{ \mathbf{x}_0 + \int_0^t \exp[-As] \mathbf{f}(s) ds \right\}$$

## 2. EXPONENCIAL DE UNA MATRIZ

La resolución de (1) puede requerir el cálculo de  $\exp(At)$ . Notación:  $\exp(At) \equiv \exp B$ . Autovalores:  $B\mathbf{y}_k = \beta_k \mathbf{y}_k$ ,  $k = 1 \dots N$ . Ec. característica:  $|B - \beta I| = a_0 + a_1\beta + \dots + a_N\beta^N \equiv P(\beta) = 0 \implies N$  raíces

*Th.* Cayley-Hamilton:  $P(B) = 0$

$$\text{Consecuencia: } P(B) = 0 \implies B^N = \sum_{k=0}^{N-1} b_k B^k$$

$$\text{Ergo: } \exp B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} B^k \underset{C-H}{=} d_0 + d_1 B + \dots + d_{N-1} B^{N-1} \sim i\{d_n\}_{n=0}^{N-1}?$$

$$\text{En general: } f(B) = \sum_{k=0}^{N-1} f_k B^k \sim i\{f_n\}_{n=0}^{N-1}?$$

Tenemos el **resultado abstracto** siguiente:  $\{B^n\}_{n=0}^{N-1}$  constituye una **base** de matrices en la cual expresar  $f(B)$  y corresponde hallar los coefs.  $\{d_n\}_{n=0}^{N-1}$ . Sin embargo, desde un punto de vista práctico es más eficaz proceder al revés: fijar de entrada los coefs. y determinar una base de matrices alternativa.

### 2.1. Caso: $A$ sin degeneración.

*Teorema-1:*

$$f(B) = f(\beta_1)Q_1 + f(\beta_2)Q_2 + \dots + f(\beta_N)Q_N \quad (4)$$

siendo  $\{Q_k\}_{k=1}^N$  independientes de  $B$ .

Ejps.:

$$\exp B = \exp(\beta_1)Q_1 + \dots + \exp(\beta_N)Q_N$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\beta_1}Q_1 + \dots + \frac{1}{\beta_N}Q_N \quad (5)$$

$$B^{999} = \beta_1^{999}Q_1 + \dots + \beta_N^{999}Q_N$$

### 2.2. Caso: $A$ con degeneración.

Sea  $\beta_1$  degenerado  $n$  veces:  $\{\beta_1, \dots, \beta_n, \beta_{n+1}, \dots, \beta_N\}$ .

*Teorema-2:* Teorema-1 se generaliza a:

$$\begin{aligned} f(B) = & f(\beta_1)Q_1 + f^{(1)}(\beta_1)Q_2 + \dots + f^{(n-1)}(\beta_1)Q_n + \\ & f(\beta_{n+1})Q_{n+1} + \dots + f(\beta_N)Q_N \end{aligned} \quad (6)$$

### 2.3. Determinación de $\{Q_k\}_{k=1}^N$ ( $A$ sin degeneración).

$\{Q_k\}_{k=1}^N$  son indeps. de  $f \rightarrow$  elijo las + simples:

$$f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^{N-1} \quad (7)$$

Construyo el sistema

$$\begin{aligned} I &= Q_1 + \dots + Q_N \\ B &= \beta_1 Q_1 + \dots + \beta_N Q_N \\ B^2 &= \beta_1^2 Q_1 + \dots + \beta_N^2 Q_N \\ &\vdots \quad \vdots \\ B^{N-1} &= \beta_1^{N-1} Q_1 + \dots + \beta_N^{N-1} Q_N \end{aligned} \quad (8)$$

Si se resuelve por Cramer aparece determinante de Vandermonde:

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq N} (\beta_j - \beta_i) \quad (9)$$

## 2.4. Determinación de $\{Q_k\}_{k=1}^N$ ( $A$ con degeneración).

Se generaliza facilmente.

$$3. \text{ EJEMPLO: } \exp \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

Ec. característica:  $\beta^2 - 2a\beta + a^2 - b^2 = 0 \rightsquigarrow \beta = a \pm b$ .

$$\exp \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = \exp(a+b)Q_+ + \exp(a-b)Q_- \quad (10)$$

Según (4)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = Q_+ + Q_-; \quad \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = (a+b)Q_+ + (a-b)Q_-$$

Podemos determinar  $Q_+, Q_-$ . Encontramos:

$$\begin{aligned} \exp \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \exp(a+b) + \exp(a-b) & \exp(a+b) - \exp(a-b) \\ \exp(a+b) - \exp(a-b) & \exp(a+b) + \exp(a-b) \end{pmatrix} \\ &= \exp(a) \begin{pmatrix} \cosh b & \sinh b \\ \sinh b & \cosh b \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (11)$$

**Otro ejercicio:** Utilizando  $Q_+, Q_-$ , encontrar  $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}^{-1}$ .

$$4. \text{ EJEMPLO: } \begin{cases} \dot{y} = z + 2 \\ \dot{z} = y + 2 \end{cases}$$

Siendo  $y(0) = 1, z(0) = 1$ , determinar la solución en  $t = \ln 2$ . Notación:  $\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}, \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Solución:

$$\mathbf{x}(t) = \exp \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t ds \exp \left[ - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} s \right] \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \quad (12)$$

Utilizado (11) con  $a = 0, b = -s$  encontramos

$$\int_0^t ds \exp \left[ - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} s \right] = \int_0^t ds \begin{pmatrix} \cosh s & -\sinh s \\ -\sinh s & \cosh s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sinh t & 1 - \cosh t \\ 1 - \cosh t & \sinh t \end{pmatrix}$$

Por tanto, (12)

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \begin{pmatrix} \cosh s & -\sinh s \\ -\sinh s & \cosh s \end{pmatrix} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sinh t & 1 - \cosh t \\ 1 - \cosh t & \sinh t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \\ &= [3 \exp(t) - 2] \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (13)$$

Solución:  $y(\ln 2) = z(\ln 2) = 4$ . ■