



PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE RISCOS PER ACCIDENTS EN L'ÚS D'AGULLES I OBJECTES PUNXANTS I TALLANTS.

ESTUDIANTS DE MEDICINA, ODONTOLOGIA I INFERMERIA

Quina és la forma més comuna de patir una punxada amb agulla?

- Quan tornem a posar la tapa protectora a les agulles.
- Quan transferim fluïts corporals entre diferents recipients.
- Quan col·loquem incorrectament les agulles usades als contenidors de seguretat a l'efecte (recipients de deixalles d'objectes que tallen i punxen).

A quins riscos estàs exposat si et punxes amb una agulla usada d'un pacient infectat?

Les punxades amb agulles t'exposen a nombrosos patògens sanguinis que causen infeccions serioses. Els riscos més importants per a la salut són:

- ✓ Virus de l'Hepatitis B.
- ✓ Virus de l'Hepatitis C.
- ✓ Virus de la immunodeficiència humana (VIH).

TOTS ELS PACIENTS S'HAURAN DE CONSIDERAR POTENCIALMENT INFECCIOSOS i per això s'han d'adoptar una sèrie de procediments de treball en l'ús de xeringues:

NORMES GENERALS

- Abans de l'inici de les pràctiques:
 - o Els professors han d'informar l'estudiant del risc que representa el treball amb xeringues, dels riscos existents i de les mesures preventives.
 - o És recomanable vacunar-se contra l'hepatitis B abans de començar les pràctiques- ÉS MOLT EFECTIVA!!!
 - o Rentar-se les mans.
 - o Cobrir-se las lesions cutànies, talls i ferides.
- Durant les pràctiques:
 - o Treballar amb precaució.
 - o Fer servir protecció mitjançant l'ús de guants per prevenir el risc de lesió cutània.
 - o Els objectes punxants i tallants s'han d'eliminar als contenidors rígids de bioseguretat disponibles:



- o Les agulles, una vegada utilitzades, mai no s'han de tornar a protegir amb la tapa protectora.
- Després de les pràctiques:
 1. Introduir el material en líquid desinfectant durant uns 15 minuts.
 2. Rentar el material amb aigua, sabó i un raspall de mànec llarg.
 3. Deixar assecar el material.
 4. Ficar-lo en bosses per esterilitzar-lo.
 5. Llevar-se els guants.
 6. Rentar-se les mans.
- Després d'un accident:
 - o Comunicar l'accident immediatament al professor, ell informará del procediment a seguir:
 1. Tractament de la ferida.
 - Retirar l'objecte causant i rebutjar-lo en un lloc adequat (contenedor de materials que tallen i punxen).
 - Deixar fluir la sang durant 2-3 minuts sota un doll d'aigua corrent.
 - No refregar, no forçar el sagnat ni realitzar maniobres agressives que puguin provocar erosions que afavoreixen la infecció.
 - Netejar la ferida amb aigua i sabó.
 - Aplicar un antisèptic (povidona iodada o un altre antisèptic).
 - Cobrir la ferida amb un apòsit impermeable.
 2. Realitzar una anàlisi sanguínia.
 3. Emplenar la documentació corresponent per a dur a terme la tramitació del segur escolar.
 - o Comunicar l'accident al Servei de Prevenció i Medi Ambient (www.uv.es/spma)