

**LECCIONES**

sobre

**GRUPOS**

por

**María Jesús Iranzo Aznar**

y

**Francisco Pérez Monasor**

Curso 2008-2009

Departamento de Algebra.

Facultad de Matemáticas. Universitat de València

## PROGRAMA

### El Teorema de Burnside por teoría abstracta de grupos

Este programa se ha impartido durante el primer cuatrimestre del curso 2008-09 en la asignatura optativa Teoría de Grupos (6 créditos).

**Lección 1:** Grupos nilpotentes. Estructura de los grupos finitos abelianos.

**Lección 2 :** Los subgrupos de Fitting y de Frattini de un grupo finito.

**Lección 3:** Grupos actuando sobre grupos. Producto semidirecto.

**Lección 4:** Los teoremas de Baer, Zenkov y Lucchini.

**Lección 5:** El teorema de Schur-Zassenhaus.

**Lección 6:** Acción coprima. El  $P \times Q$ -lema de Thompson.

**Lección 7:** Preliminares para el  $p^a q^b$ -teorema.

**Lección 8:** Demostración del  $p^a q^b$ -teorema.

## Lección 1. Grupos nilpotentes. Estructura de los grupos finitos abelianos.

**Definición 1.** Un grupo  $G$  se dice **nilpotente** si posee una serie de subgrupos:

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_n = 1$$

tal que  $G_i/G_{i+1} \leq Z(G/G_{i+1}) \forall i \ 0 \leq i \leq n-1$ .

Los grupos nilpotentes son resolubles y los grupos abelianos son nilpotentes.

Notar que  $G_i/G_{i+1} \leq Z(G/G_{i+1}) \Leftrightarrow [G/G_{i+1}, G_i/G_{i+1}] = 1 \Leftrightarrow [G, G_i]G_{i+1}/G_{i+1} = 1 \Leftrightarrow [G, G_i] \leq G_{i+1} \forall i$ .

Una serie de subgrupos normales  $N_0 \leq N_1 \leq \dots \leq N_r$  de un grupo  $G$  se dice central si :  $N_{i+1}/N_i \leq Z(G/N_i) \forall i$ . Así un grupo  $G$  será nilpotente si posee una serie central que contiene a  $G$  y a 1.

En cualquier grupo  $G$  se pueden construir dos series centrales:  $1 = Z_0(G)$  e inductivamente se define  $Z_i(G)$  por  $Z_i(G)/Z_{i-1}(G) = Z(G/Z_{i-1}(G))$ .

Dado que si  $H/K \text{ car } G/K$  y  $K \text{ car } G$  se sigue que  $H \text{ car } G$ , se obtiene así una serie de subgrupos característicos en  $G$ , que se conoce como la **serie central superior** de  $G$ .

De forma análoga se define :  $G = \Gamma_1(G)$  e inductivamente  $\Gamma_{i+1}(G) = [G, \Gamma_i(G)]$ . Se obtiene así una serie de subgrupos característicos de  $G$ , que se conoce como **serie central inferior** de  $G$ .

**Teorema 2.** Sea  $G$  un grupo y  $n \geq 1$ . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

i)  $\Gamma_{n+1}(G) = 1$  ii)  $Z_n(G) = G$ .

Además  $G$  es nilpotente si y solo si i) y ii) se cumplen para un cierto  $n \geq 1$ .

**Demostración:** Ciertamente si se cumple i) ó ii)  $G$  es nilpotente.

Supongamos ahora que  $G$  es nilpotente. Si  $1 = N_0 \leq N_1 \leq \dots \leq N_r = G$  es una serie central veamos que:

a)  $\Gamma_i(G) \leq N_{r-i+1} \forall i$ . Notar que  $\Gamma_1(G) = G = N_{r-1+1}$ . Supuesto que  $\Gamma_i(G) \leq N_{r-i+1}$ , tenemos:  $\Gamma_{i+1}(G) = [G, \Gamma_i(G)] \leq [G, N_{r-i+1}] \leq N_{r-i}$ . En particular  $\Gamma_{r+1}(G) = 1$ .

b)  $N_i \leq Z_i(G) \forall i$ . Se tiene que :  $1 = N_0 \leq Z_0(G) = 1$ . Suponer que  $N_i \leq Z_i(G)$ . Existe un epimorfismo  $\phi : G/N_i \rightarrow G/Z_i(G)$  dado por  $\phi(xN_i) = xZ_i(G)$ . Como  $N_{i+1}/N_i \leq Z(G/N_i)$  se sigue que  $N_{i+1}Z_i(G)/Z_i(G) \leq Z(G/Z_i(G)) = Z_{i+1}(G)/Z_i(G)$ ,

por lo tanto  $N_{i+1} \leq Z_{i+1}(G)$ . En particular  $Z_r(G) = G$ .

Veamos ahora que i) y ii) son equivalentes.

$i) \implies ii)$ . Sea  $N_0 = \Gamma_{n+1}$ ,  $\Gamma_n(G) = N_1, \dots, N_n = \Gamma_1(G) = G$ . Por lo probado en b) se tiene que  $Z_n(G) = G$ .

$ii) \implies i)$ . Sea  $N_i = Z_i(G) \forall i$ . En particular  $N_n = Z_n(G) = G$  y por lo probado en a) se tiene que  $\Gamma_{n+1}(G) = 1$ .

Si  $G$  es nilpotente, al menor  $n$  tal que  $Z_n(G) = G$ , se le llama **clase de nilpotencia** de  $G$

**Ejemplo.** Sabemos que  $SL(2, 3)/Z(SL(2, 3)) \cong A_4$  por lo tanto

$$Z(SL(2, 3)/Z(SL(2, 3))) \cong Z(A_4) = 1$$

, así  $Z_2(SL(2, 3)) = Z(SL(2, 3))$ , por lo que  $SL(2, 3)$  es un ejemplo de grupo resoluble con centro no trivial pero no nilpotente.

**Teorema 3.** Sea  $G$  nilpotente y  $H < G$ , entonces  $H < N_G(H)$

**Demostración.** Como  $H < G$  existe  $i$  tal que  $\Gamma_{i+1}(G) \leq H$  pero  $\Gamma_i(G) \not\leq H$ . Entonces :  $[\Gamma_i(G), H] \leq [\Gamma_i(G), G] = \Gamma_{i+1}(G) \leq H$ . Así  $\Gamma_i(G) \leq N_G(H)$ .

**Teorema 4.** Sea  $G$  nilpotente y  $1 \neq N \trianglelefteq G$ , entonces i)  $[G, N] < N$  ii)  $N \cap Z(G) \neq 1$ .

**Demostración:** Construyamos la serie:  $N_1 = N$ ,  $N_2 = [G, N], \dots, N_{i+1} = [G, N_i]$ . Como  $N_i \leq \Gamma_i(G) \forall i$  y existe  $m$  tal que  $\Gamma_m(G) = 1$ , se tendrá que  $N_m = 1$ . Así  $N_2 = [G, N] < N$ , pues en caso contrario  $N_i = N \forall i$  y se llegaría a contradicción con que  $1 \neq N$ . Sea  $k$  tal que  $N_k = 1$  pero  $N_{k-1} \neq 1$ . Se tiene que  $[G, N_{k-1}] = N_k = 1$  luego  $1 \neq N_{k-1} \leq N \cap Z(G)$ .

En cuanto a las propiedades de la clase de grupos nilpotentes es sencillo probar que todo subgrupo y todo cociente de un grupo nilpotente es también nilpotente. Veamos ahora que la clase de los grupos nilpotentes tiene la Z-propiedad.

**Teorema 5.** Si  $G/Z(G)$  es nilpotente entonces  $G$  es nilpotente.

**Demostración.** Como  $G/Z(G)$  es nilpotente existe una serie central

$$G/Z(G) = H_0/Z(G) \geq \dots \geq H_r/Z(G) = 1$$

por lo tanto  $[G/Z(G), H_i/Z(G)] \leq H_{i+1}/Z(G) \forall i$ , así  $[G, H_i] \leq H_{i+1}$ . Considerar la serie:

$$G = H_0 \geq \dots \geq H_r = Z(G) \geq 1$$

para afirmar que  $G$  es nilpotente.

**Teorema 6.** Todo  $p$ -grupo finito es nilpotente.

**Demostración:** Por inducción sobre el orden de  $G$ . Suponer  $G \neq 1$ . Sabemos que  $Z(G) \neq 1$ . Como  $G/Z(G)$  es un  $p$ -grupo de orden estrictamente menor que el de  $G$ , por hipótesis de inducción se tiene que  $G/Z(G)$  es nilpotente y por la  $Z$ -propiedad se sigue que  $G$  es nilpotente.

**Ejercicio.** Comprobar que la clase de nilpotencia de  $D_8$  y de  $Q_8$  es 2.

**Teorema 7.** Si  $G_1, G_2, \dots, G_n$  son grupos nilpotentes entonces  $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$  es nilpotente.

**Demostración:** Bastará probarlo para el caso  $n = 2$ .

Sea  $G = H \times K$ , con  $H, K$  nilpotentes. Existen series centrales.

$$1 = H_0 \leq H_1 \leq \dots \leq H_m = H$$

$$1 = K_0 \leq K_1 \leq \dots \leq K_n = K$$

verificando que  $[H, H_i] \leq H_{i-1}$  y que  $[K, K_i] \leq K_{i-1}$  respectivamente. Repitiendo términos si es necesario, podemos suponer que  $n = m$  y se tiene :

$$1 = H_0 \times K_0 \leq H_1 \times K_1 \leq \dots \leq H_n \times K_n = H \times K$$

Como  $[H \times K, H_i \times K_i] = [H, H_i] \times [K, K_i] \leq H_{i-1} \times K_{i-1}$ , se concluye que  $H \times K$  es nilpotente.

En el caso de grupos finitos, algunas de las propiedades anteriormente citadas caracterizan la nilpotencia del grupo.

**Teorema 8.** Si  $G$  es finito, son equivalentes:

- i)  $G$  es nilpotente
- ii) Si  $H < G$  entonces  $H < N_G(H)$

- iii) Cada subgrupo maximal de  $G$  es normal en  $G$ .
- iv) Cada subgrupo de Sylow de  $G$  es normal en  $G$
- v)  $G$  es producto directo de  $p$ -grupos para algunos primos  $p$ .

**Demostración:**  $i) \implies ii)$  Demostrado en el Teorema 3 para grupos nilpotentes cualesquiera.

$ii) \implies iii)$  Si  $M < G$  como  $M < N_G(M)$  necesariamente  $N_G(M) = G$ .

$iii) \implies iv)$  Si  $P \in \text{Syl}_p(G)$  y  $N_G(P) < G$ , sea  $M < G$  tal que  $N_G(P) \leq M$ . Sabemos que entonces  $M = N_G(M) = G$ , lo que es una contradicción.

$iv) \implies v)$  Notar que en tal caso  $G$  es producto directo de sus subgrupos de Sylow.

$v) \implies i)$  Basta aplicar los Teoremas 6 y 7 para concluir que  $G$  es nilpotente.

**Teorema 9.** Sea  $G$  finito  $G = MN$   $M, N \trianglelefteq G$ . Si  $M, N$  son nilpotentes, entonces  $G$  es nilpotente.

**Demostración:** Sea  $P \in \text{Syl}_p(G)$ . Sabemos que  $P = (P \cap M)(P \cap N)$ . Por el teorema anterior  $P \cap M \trianglelefteq M$  y  $P \cap N \trianglelefteq N$ . Más aún dichas intersecciones son subgrupos característicos de  $M$  y  $N$  respectivamente, por lo tanto son subgrupos normales de  $G$ . Concluimos que  $P \trianglelefteq G$  y que por el teorema anterior  $G$  es nilpotente.

Como consecuencia del resultado anterior si  $G$  es finito se define el mayor subgrupo normal nilpotente de  $G$ , al que se denota por  $F(G)$  y se llama **subgrupo de Fitting** de  $G$ .

Para probar el teorema de estructura de grupos finitos abelianos, probaremos previamente el siguiente resultado.

**Teorema 10.** Si  $G$  es un  $p$ -grupo finito abeliano y  $C$  es un subgrupo de  $G$  cíclico del orden mayor posible, existe un subgrupo  $B$  de  $G$  de forma que  $G = C \times B$ .

**Demostración:** Podemos suponer que  $C < G$  y elegir  $x \in G - C$  de orden el menor posible. Como  $x \neq 1$   $o(x^p) < o(x)$ , así  $x^p \in C$ . Si  $\langle x^p \rangle = C$  sería  $|\langle x \rangle| = p|C|$ , lo que no es posible por la elección de  $C$ . Si  $C = \langle c \rangle$ , existe  $m$  tal que  $x^p = c^m$  y por lo anterior necesariamente  $p|m$ . Sea  $m = m'p$ . Se tiene que  $x^p = (c^{m'})^p$ . Llamemos  $y = c^{m'}$ , entonces  $y \in C$ ,  $xy^{-1} \neq 1$  y  $xy^{-1} \notin C$ . Además  $(xy^{-1})^p = x^p(y^p)^{-1} = 1$ . Por la elección de  $x$  tenemos que  $o(x) \leq o(xy^{-1}) = p$ , así que  $o(x) = p$ . Sea  $X = \langle x \rangle$ . Considerar el

homomorfismo canónico  $\phi$  de  $G$  sobre  $G/X = \bar{X}$ . Como  $|X| = p$  se tiene que  $X \cap C = 1$  y  $\phi(C) = \bar{C} = CX/X \cong C$ , luego  $\bar{C}$  es cíclico de igual orden que  $C$ . Si  $\bar{G}$  tuviera un subgrupo cíclico  $\langle \bar{g} \rangle$  de orden mayor que  $\bar{C}$ , se tendría:

$$|\langle g \rangle| = o(g) \geq o(\bar{g}) = |\langle \bar{g} \rangle| > |\bar{C}| = |C|$$

lo que es una contradicción. Así  $\bar{C}$  es un subgrupo cíclico de  $\bar{G}$  de orden máximo. Trabajando por inducción, como  $|\bar{G}| < |G|$ , se concluye que  $\bar{C}$  es un factor directo de  $\bar{G}$ , es decir que existe  $\bar{B} \leq \bar{G}$  tal que  $\bar{G} = \bar{C} \times \bar{B}$  siendo  $\bar{B} = B/X$ . Así  $G = CB$ ,  $CX \cap B = X(C \cap B) = X$ , luego  $C \cap B \leq X \cap C = 1$  y  $G = C \times B$ .

**Teorema 11.** (Teorema de estructura de los grupos finitos abelianos). Si  $G$  es un grupo finito abeliano,  $G$  es producto directo de grupos cíclicos.

**Demostración:** Por inducción sobre el orden de  $G$ . Como  $G$  es nilpotente, por el teorema 8,  $G$  es producto directo de sus subgrupos de Sylow. Si el orden de  $G$  es divisible por al menos dos primos distintos, por hipótesis de inducción cada uno de los correspondientes subgrupos de Sylow se expresará como producto directo de cíclicos y por tanto también  $G$ . Debemos suponer que  $G$  es un  $p$ -grupo para algún primo  $p$ . Por el teorema anterior  $G = C \times B$ , siendo  $C$  un subgrupo cíclico de orden máximo como tal. Si  $B = 1$ ,  $G$  es cíclico. Si  $B \neq 1$  se expresará como producto directo de cíclicos y por tanto también  $G$ .

## Lección 2. Los subgrupos de Fitting y de Frattini de un grupo finito

En toda la lección los grupos considerados son finitos.

**Definición 1.** El **subgrupo de Frattini** de un grupo  $G$ , denotado por  $\phi(G)$ , es la intersección de todos los subgrupos maximales de  $G$ .

**Notas.** Como consecuencia de la definición se tiene:

- a)  $\phi(G)$  es un subgrupo característico de  $G$ .
- b)  $G \neq 1 \implies \phi(G) < G$ .
- c) Si  $H \leq G$  y  $G = H\phi(G)$ , se sigue que  $G = H$ .

En efecto, si  $H < G$  existe  $M < .G$  tal que  $H \leq M$ . Así  $G = M\phi(G) = M$ , lo que no es posible.

- d) Si  $N \trianglelefteq G$ , se tiene que  $\phi(G)N/N \leq \phi(G/N)$

Un subgrupo maximal de  $G/N$  es de la forma  $M/N$  con  $M < .G$ , por lo tanto  $\phi(G)N/N \leq \phi(G/N)$ .

- e) Si  $N \trianglelefteq G$  se tiene que:  $\phi(N) \leq \phi(G)$ .

En efecto, si existe  $M < .G$  tal que  $\phi(N) \not\leq M$ ,  $G = \phi(N)M$  luego  $N = N \cap \phi(N)M = \phi(N)(N \cap M) = N \cap M$ , luego  $N \leq M$ , que es una contradicción.

**Teorema 2.** Son equivalentes:

- i)  $G$  es nilpotente.
- ii)  $G/\phi(G)$  es abeliano.
- iii)  $G/\phi(G)$  es nilpotente.

**Demostración:** i)  $\implies$  ii). Si  $M < .G$ , por el Teorema 8 de la Lección 1 sabemos que  $M \trianglelefteq G$ , luego  $G/M$  tiene orden primo y por tanto  $G' \leq M$ , luego  $G' \leq \phi(G)$  y  $G/\phi(G)$  es abeliano.

Es claro que ii)  $\implies$  iii).

iii)  $\implies$  i) Basta probar que cualquier subgrupo maximal de  $G$  es normal en  $G$ . Sea  $M < .G$ . Como  $M/\phi(G) < .G/\phi(G)$  es  $M/\phi(G) \trianglelefteq G/\phi(G)$ , así que  $M \trianglelefteq G$ .

**Ejercicio.** Demostrar que si  $n \geq 2$  se tiene que  $\phi(\Sigma_n) = 1$ .

**Teorema 3.** Sea  $N \trianglelefteq G$  y  $\phi(G) \leq N$ . Entonces  $N$  es nilpotente si y solo si  $N/\phi(G)$  es nilpotente.

**Demostración:** Si  $N$  es nilpotente sabemos que también lo será  $N/\phi(G)$ . Suponer ahora que  $N/\phi(G)$  es nilpotente. Sea  $P \in \text{Syl}_p(N)$ , entonces:

$$P\phi(G)/\phi(G) \in \text{Syl}_p(N/\phi(G))$$

luego  $P\phi(G)/\phi(G) \trianglelefteq N/\phi(G)$ , por lo tanto:

$$P\phi(G)/\phi(G) \text{car} N/\phi(G) \trianglelefteq G/\phi(G)$$

luego  $P\phi(G) \trianglelefteq G$ . Por el argumento de Frattini se tiene:  $G = P\phi(G)N_G(P) = N_G(P)$  y por el Teorema 8 de la Lección 1, se sigue que  $N$  es nilpotente.

Como consecuencia del resultado anterior  $\phi(G)$  es nilpotente y por tanto que  $\phi(G) \leq F(G)$ .

**Corolario 4.**  $F(G/\phi(G)) = F(G)/\phi(G)$ .

**Demostración:** Como todo cociente de un grupo nilpotente es también nilpotente,  $F(G)/\phi(G) \leq F(G/\phi(G))$ . Por otra parte si  $F(G/\phi(G)) = H/\phi(G)$ , por el Teorema anterior  $H$  será subgrupo normal nilpotente de  $G$ , luego  $H \leq F(G)$ .

**Teorema 5.** Si  $G$  es resoluble y  $N \trianglelefteq G$ , existe  $p$  primo tal que  $N$  es  $p$ -elemental abeliano.

**Demostración:** Como  $N' < N$  y  $N' \text{car} N \trianglelefteq G$ , es  $N' \trianglelefteq G$  y por la minimalidad de  $N$  se tiene que  $N' = 1$ , luego  $N$  es abeliano. Sea  $p || N|$ . Consideremos el conjunto  $\{x \in N | x^p = 1\}$ . Dicho conjunto es un subgrupo característico de  $N$  luego normal de  $G$  y como no es trivial, debe coincidir con  $N$ . Así  $N$  es  $p$ -elemental abeliano.

Observar que si  $G \neq 1$  es resoluble, se tiene que  $\phi(G) < F(G)$ . En efecto basta tomar  $N/\phi(G) \trianglelefteq G/\phi(G)$ . Por el Teorema anterior  $N/\phi(G)$  es abeliano luego nilpotente. Por el Teorema 3  $N$  es nilpotente luego  $\phi(G) < N \leq F(G)$ .

**Teorema 6.** a) Si  $G$  es resoluble  $C_G(F(G)) \leq F(G)$  ( $G$  es  $N$ -constricto).

b) Si  $N \trianglelefteq G$  se tiene que  $F(G) \leq C_G(N)$ .

**Demostración.** a) Si  $C_G(F(G)) \not\leq F(G)$   $A = C_G(F(G)) \cap F(G) < C_G(F(G))$ . Sea  $H$  minimal en cuanto a ser un subgrupo normal de  $G$  contenido en  $C_G(F(G))$  y conteniendo propiamente a  $A$ . Entonces  $H/A \trianglelefteq G/A$ , luego, por el Teorema 5, es abeliano. Así  $H' \leq A$

y  $[H, H, H] = 1$ , por lo que  $H$  es nilpotente luego  $H \leq F(G)$ . Por lo tanto  $H \leq A$ , lo que es una contradicción.

b)  $[N, F(G)] \leq N \cap F(G)$ . Si  $N \cap F(G) = 1$ ,  $F(G) \leq C_G(N)$ . En otro caso  $N \cap F(G) = N$  luego  $N \leq F(G)$  y por el Teorema 4 de la Lección 1  $N \cap Z(F(G)) \neq 1$ , luego  $N \leq Z(F(G))$  y también  $F(G) \leq C_G(N)$ .

**Teorema 7.**(Gaschütz)  $G' \cap Z(G) \leq \phi(G)$ .

**Demostración:** Suponer que existe  $M < G$  tal que  $G' \cap Z(G) \not\leq M$ . Entonces  $G = (G' \cap Z(G))M$ , luego  $M \triangleleft G$  y por tanto  $G' \leq M$ , lo que es una contradicción.

### Lección 3. Grupos actuando sobre grupos. Producto semidirecto.

**Definición 1.** Se dice que un grupo  $H$  actúa sobre un grupo  $K$ , cuando existe un homomorfismo de grupos  $\phi : H \longrightarrow \text{Aut}(K)$ .

Dado  $k \in K$  y  $h \in H$ , escribiremos  $k^h$  para denotar a  $\phi(h)(k)$ .

#### Ejemplos

- i) Si  $H \leq \text{Aut}(K)$ , considerar la inmersión de  $H$  en  $\text{Aut}(K)$ .
- ii) Si  $K \trianglelefteq H$ , considerar la acción de  $H$  sobre  $K$  vía conjugación, es decir el homomorfismo

$$\phi : H \longrightarrow \text{Aut}(K)$$

dado por  $\phi(h) = \phi_h$  siendo  $\phi_h(k) = k^h$ , cualesquiera que sean  $h \in H$  y  $k \in K$ .

En particular si  $H \leq G$ ,  $N_G(H)$  actúa sobre  $H$  vía conjugación, siendo el núcleo de tal acción el  $C_G(H)$ .

- iii) Dados dos grupos  $H, K$ , siempre existe una acción de  $H$  sobre  $K$ , que es la acción trivial, considerando el homomorfismo trivial de  $H$  en  $\text{Aut}(K)$ .

**Teorema 2.** Sea  $H$  actuando sobre  $K$  vía  $\phi$ . Entonces el conjunto de los pares ordenados  $(h, k)$  con  $h \in H$  y  $k \in K$ , adquiere una estructura de grupo, con la siguiente operación interna:

$$(h_1, k_1)(h_2, k_2) = (h_1 h_2, k_1^{h_2} k_2)$$

**Demostración:** Si  $h_1, h_2, h_3 \in H$  y  $k_1, k_2, k_3 \in K$ , se tiene

$$(h_1, k_1)[(h_2, k_2)(h_3, k_3)] = (h_1, k_1)(h_2 h_3, k_2^{h_3} k_3) = (h_1 h_2 h_3, k_1^{h_2 h_3} k_2^{h_3} k_3)$$

$$[(h_1, k_1)(h_2, k_2)](h_3, k_3) = (h_1 h_2, k_1^{h_2} k_2)(h_3, k_3)$$

$$= (h_1 h_2 h_3, (k_1^{h_2} k_2)^{h_3} k_3) = (h_1 h_2 h_3, k_1^{h_2 h_3} k_2^{h_3} k_3)$$

por lo que la operación es asociativa. Es sencillo comprobar que el neutro es  $(1, 1)$  y que  $(h, k)^{-1} = (h^{-1}, (k^{-1})^{h^{-1}})$ .

Dicho grupo se conoce como **producto semidirecto de  $H$  por  $K$**  vía la acción  $\phi$  y se denota por  $H \times_{\phi} K$ .

Si consideramos a  $\text{Aut}(K)$  actuando sobre  $K$  en la forma natural, al producto semidirecto resultante se le conoce como holomorfo de  $K$ :  $\text{Hol}(K)$ . Más generalmente, si  $H \leq \text{Aut}(K)$ , el correspondiente grupo semidirecto se conoce como un holomorfo relativo de  $K$ .

Si  $A$  es un grupo abeliano tal que  $b^2 \neq 1$ , para algún  $b \in A$ , se define  $\eta : A \rightarrow A$  mediante  $\eta(a) = a^{-1} \forall a \in A$ . Entonces  $\eta \in \text{Aut}(A)$ ,  $\eta \neq 1$  y al holomorfo relativo se le llama grupo diédrico generalizado asociado a  $A$  y se denota por  $\text{Dih}(A)$ .

Si consideramos a  $H$  actuando trivialmente sobre  $K$ , el producto semidirecto asociado a dicha acción es el producto directo  $H \times K$ .

**Teorema 3.** Sea  $H$  actuando sobre  $K$  vía  $\phi$  y  $G = H \times_{\phi} K$ . Si consideramos  $\bar{H} = \{(h, 1) | h \in H\}$  y  $\bar{K} = \{(1, k) | k \in K\}$ , se tiene que :

i)  $\bar{H} \leq G$ ,  $\bar{K} \trianglelefteq G$ ,  $G = \bar{H}\bar{K}$ ,  $\bar{H} \cap \bar{K} = 1$ .

ii)  $H \cong \bar{H}$  y  $K \cong \bar{K}$ .

iii) Tras las correspondientes identificaciones, la acción de  $H$  sobre  $K$ , es la restricción a  $H$  de la acción por conjugación de  $G$  sobre  $K$ .

**Demostración:** Dada la sencillez de i) y ii), comprobaremos únicamente iii).

$$(h, 1)^{-1}(1, k)(h, 1) = (h^{-1}, 1)(1, k)(h, 1) = (h^{-1}, k)(h, 1) = (1, k^h)$$

**Definición 4.** Si  $K \trianglelefteq G$ , se dice que  $G$  se escinde sobre  $K$ , si existe  $H \leq G$  tal que  $G = HK$  y  $H \cap K = 1$ . Dicho  $H$  se dice que es un **complemento** de  $K$  en  $G$ .

**Teorema 5.** i) Sea  $H$  actuando sobre  $K$  vía  $\phi$  y  $G = H \times_{\phi} K$ . Entonces  $G$  se escinde sobre  $\bar{K}$  con complemento  $\bar{H}$ .

ii) Sea  $K \trianglelefteq G$ . Suponer que  $G$  se escinde sobre  $K$  con complemento  $H$ . Considerar la acción  $\phi$  de  $H$  sobre  $K$  vía conjugación, entonces  $G \cong H \times_{\phi} K$ .

**Demostración:** i) Vista en el teorema anterior.

ii) Notar que cada elemento  $g$  de  $G$  es expresable de forma única como  $g = h k$ , con  $h \in H$  y  $k \in K$ . Definamos la siguiente aplicación:

$$\alpha : G \rightarrow H \times_{\phi} K$$

dada por  $\alpha(g) = (h, k)$ , supuesto que  $g = hk$ . Es sencillo probar que es un homomorfismo de grupos. En efecto:

$$\alpha(h_1 k_1 h_2 k_2) = \alpha(h_1 h_2 k_1^{h_2} k_2) = (h_1 h_2, k_1^{h_2} k_2) = (h_1, k_1)(h_2, k_2)$$

Es claro es un isomorfismo de grupos.

## Lección 4. Los teoremas de Baer, Zenkov y Lucchini.

Los grupos considerados son finitos.

**Teorema 1** (Baer). Sea  $x$  un  $p$ -elemento de un grupo  $G$ . Son equivalentes:

- i)  $x \in O_p(G)$
- ii)  $\langle x^h, x^g \rangle$  es  $p$ -grupo, cualesquiera que sean  $h, g \in G$ .

**Demostración:** Seguiremos la demostración de Alperin y Lyons.

Es claro que  $i) \implies ii)$ , ya que  $O_p(G) \trianglelefteq G$ .

$ii) \implies i)$ . Sea  $G$  un contraejemplo y  $C = x^G$  la clase de conjugación de  $x$  en  $G$ . Sea  $P \in \text{Syl}_p(G)$ . Si  $C \subseteq P$  entonces  $\langle C \rangle \leq P$  y como  $\langle C \rangle \trianglelefteq G$  se tendría que  $x \in \langle C \rangle \leq O_p(G)$  y  $G$  no sería contraejemplo. Podemos afirmar que  $C - P \neq \emptyset$ , así que existe  $Q \in \text{Syl}_p(G)$  tal que  $(C \cap Q) - (C \cap P) \neq \emptyset$ .

Sea  $\mathcal{M} = \{(P, Q) \mid C \cap P \neq C \cap Q\}$ , que por lo anterior no es vacío. Elijamos  $(P, Q) \in \mathcal{M}$  con  $|C \cap P \cap Q|$  lo mayor posible. Sea  $D = \langle C \cap P \cap Q \rangle$ , notar que  $\langle C \cap D \rangle = D$ , ya que es claro que  $\langle C \cap D \rangle \leq D$  y como  $C \cap P \cap Q \subseteq C \cap D$ , se tiene que  $D \leq \langle C \cap D \rangle$ . Sea  $g \in G$  tal que  $P^g = Q$ , entonces  $(C \cap P)^g = C \cap Q$ , así  $|C \cap P| = |C \cap Q|$  y como  $C \cap P \neq C \cap Q$ , se tiene que  $C \cap P \not\subseteq Q$ , así  $C \cap P \not\subseteq D$ , ya que si  $C \cap P \subseteq D$  se tendría que  $C \cap P \subseteq \langle C \cap P \rangle \leq D \leq Q$ , que no es posible. Consideremos la serie:

$$D = P_0 \leq P_1 \leq \dots \leq P_n = P$$

con  $|P_i/P_{i-1}| = p$  para todo  $i$ . Como  $C \cap P_n \not\subseteq D$  pero  $C \cap P_0 \subseteq D$ , sea  $i$  el menor posible tal que  $C \cap P_i \not\subseteq D$  ( $i \geq 1$ ). Sea  $u \in (C \cap P_i) - D$ . Como  $u$  normaliza a  $C \cap P_{i-1} = C \cap D$ , también normaliza a  $\langle C \cap D \rangle = D$ . Así

$$u \in (C \cap P \cap N_G(D)) - D$$

De igual forma existe

$$v \in (C \cap Q \cap N_G(D)) - D$$

Como por la hipótesis  $\langle u, v \rangle$  es  $p$ -grupo, también  $\langle u, v \rangle D$  es  $p$ -grupo, luego existe  $R \in \text{Syl}_p(G)$  tal que  $\langle u, v \rangle D \leq R$ . Así

$$C \cap P \cap R \supseteq C \cap P \cap \langle u, v \rangle D \supseteq (C \cap D) \cup \{u\}$$

y por tanto :

$$|C \cap P \cap R| > |C \cap D| \geq |C \cap P \cap Q|$$

luego por la elección de  $(P, Q)$  se concluye que  $(P, R) \notin \mathcal{M}$ , es decir que  $C \cap P = C \cap R$ .

Un argumento análogo lleva a que  $C \cap Q = C \cap R$ , así  $C \cap P = C \cap Q$ , lo que es una contradicción.

**Corokario 2.** Sea  $t$  una involución de un grupo  $G$ . Si  $t \notin O_2(G)$  existe un  $2'$ -elemento  $h \neq 1$  tal que  $h^t = h^{-1}$ .

**Demostración:** Por el teorema anterior existe  $g \in G$  tal que  $\langle t, t^g \rangle$  no es 2-grupo. Así como  $t^{-1}(tt^g)t = t^g t = (t^g)^{-1}t^{-1} = (tt^g)^{-1}$ ,  $t$  invierte a cada elemento de  $\langle tt^g \rangle$ , que no es un 2-grupo ya que si lo fuera,  $\langle t, t^g \rangle = \langle t, tt^g \rangle = \langle t \rangle \langle tt^g \rangle$  sería 2-grupo.

**Teorema 3** (Zenkov). Sean  $A, B$  subgrupos abelianos de un grupo  $G$ . Si  $M$  es minimal en el conjunto  $\{A \cap B^g | g \in G\}$ , entonces  $M \leq F(G)$ .

**Demostración:**  $\{A \cap B^g | g \in G\}$ , es el mismo que si sustituimos  $B$  por un conjugado suyo arbitrario, así que puede suponerse que  $M = A \cap B$ . Veamos por inducción sobre el orden de  $G$  que  $M \leq F(G)$ .

Supongamos que  $G = \langle A, B^g \rangle$ , para algún  $g \in G$ . Como  $A$  y  $B^g$  son abelianos,  $A \cap B^g \leq Z(G)$  y por tanto  $(A \cap B^g)^{g^{-1}} = A \cap B^g \leq B$  luego  $A \cap B^g \leq A \cap B = M$  y por la minimalidad de  $M$  es  $M = A \cap B^g \leq Z(G) \leq F(G)$ .

Podemos por tanto suponer que  $\langle A, B^g \rangle = G$  para cualquier  $g \in G$ . Para probar que  $M \leq F(G)$  basta razonar que si  $P \in \text{Syl}_p(M)$  se tiene que  $P \leq F(G)$ , para cualquier  $p \in \pi(M)$ , o lo que es lo mismo que  $P \leq O_p(G)$ . Por el teorema de Baer basta con probar que  $\langle P, P^g \rangle$  es  $p$ -grupo para cualquier  $g \in G$ .

Dado  $g \in G$ , sea  $H = \langle A, B^g \rangle = G$  y  $C = H \cap B$ . Si  $h \in H$  se tiene:

$$A \cap C^h = A \cap (B \cap H)^h = A \cap B^h \cap H = A \cap B^h$$

en particular  $M = A \cap B = A \cap C$  es minimal en  $\{A \cap C^h | h \in H\}$ . Por hipótesis de inducción  $P \leq M \leq F(H)$ , es decir  $P \leq O_p(H)$ . Como  $P^g \leq B^g \leq H$ ,  $P^g$  normaliza a  $O_p(H)$ , así  $P^g O_p(H)$  es  $p$ -grupo, que contiene a  $P$  y a  $P^g$ , así que  $\langle P, P^g \rangle$  es  $p$ -grupo, como queríamos probar.

Observar que si  $G$  es un grupo con  $p$ -subgrupos de Sylow abelianos, por el teorema de Zenkov existe  $g \in G$  tal que  $P \cap P^g \leq O_p(G)$ , siendo  $P \in \text{Syl}_p(G)$ . Por tanto  $P \cap P^g = O_p(G)$  y así  $O_p(G)$  se puede expresar como la intersección de  $P$  y  $P^g$ , ambos subgrupos de Sylow de  $G$ . Este resultado se conoce como teorema de Brodkey.

**Corolario 4.** Sea  $A \leq G \neq 1$ ,  $A$  abeliano. Suponer que  $|G : A| \leq |A|$ . Entonces  $A \cap F(G) \neq 1$ .

**Demostración:** Podemos suponer que  $A < G$  y que por tanto  $AA^g \neq G$ , ya que si  $G = AA^g$ ,  $g = ab$  con  $a \in A$  y  $b \in A^g$ , así  $gb^{-1} = a$  y  $A^g = (A^g)^{b^{-1}} = A^a = A$ , lo que no es posible pues  $A < G$ .

Si  $g \in G$   $|A||A^g| = |A|^2 \geq |A||G : A| = |G|$ . Por lo tanto:

$$|G| > |AA^g| = |A||A^g|/|A \cap A^g| \geq |G|/|A \cap A^g|$$

luego  $A \cap A^g \neq 1$  y por el teorema de Zenkov con  $B = A$ , se sigue que  $A \cap F(G) \neq 1$ .

Se ha probado que si  $A \leq G \neq 1$ ,  $A$  abeliano con  $|G : A| \leq |A|$ , entonces  $A$  contiene un subgrupo subnormal no trivial de  $G$ , es decir un subgrupo de  $G$  que forma parte de una serie normal de  $G$ . Si  $A$  es cíclico, probaremos a continuación que  $A$  contiene un subgrupo normal no trivial de  $G$ .

**Teorema 5** (Lucchini). Sea  $A$  un subgrupo cíclico propio de un grupo  $G$  y  $K = \text{core}_G(A)$ . Entonces :

$$|A : K| < |G : A|$$

En particular si  $|G : A| \leq |A|$ , se sigue que  $K \neq 1$ .

**Demostración:** Por inducción sobre el orden de  $G$ . Si  $K \neq 1$ , como  $A/K$  es subgrupo cíclico de  $G/K$  y  $\text{core}_{G/K}(A/K) = 1$ , por hipótesis de inducción se tendría que  $|A/K| < |G/K : A/K| = |G : A|$ . Podemos por tanto suponer que  $K = 1$  y probaremos que  $|A| < |G : A|$ . Suponer que  $|G : A| \leq |A|$ . Como  $A < G$ ,  $G$  no es trivial y por el Corolario anterior  $A \cap F(G) \neq 1$ , en particular  $F(G) \neq 1$ . Sea  $N \trianglelefteq G$ ,  $N \leq F(G)$ . Sabemos que  $N \leq Z(F(G))$  luego  $N$  es  $p$ -elemental abeliano para algún primo  $p$ . Además  $N$  normaliza a  $A \cap F(G)$ , así  $A \cap F(G) \trianglelefteq AN$  y como  $K = 1$  debe de ser  $AN < G$ .

Sea  $\bar{G} = G/N$  y  $\bar{M} = \text{core}_{\bar{G}}(\bar{A}) = M/N \leq AN/N < G/N$ . Entonces  $AM = AN$ . Por hipótesis de inducción se tiene que :  $|\bar{A} : \bar{M}| < |\bar{G} : \bar{A}|$  luego  $|AN : M| < |G : AN|$ .

Sea  $B = A \cap M$ , se tiene:

$$|AN : A| = |AM : A| = |M : A \cap M| = |M : B|$$

así:

$$|AN : M| = |A : B|$$

y se concluye que:

$$\begin{aligned} |M : B| &= |AN : A| = |G : A|/|G : AN| < |G : A|/|AN : M| = \\ &= |G : A|/|A : B| \leq |A|/|A : B| = |B| \end{aligned}$$

Suponer que  $M$  es abeliano y  $\phi : M \rightarrow M$  dada por  $\phi(x) = x^p$ . Se tiene que  $N \subseteq \text{Ker}(\phi)$  y  $N \leq M \leq AN$ , así que  $M = NB$  y  $\phi(M) = \phi(B) \leq B \leq A$ . Como  $M \trianglelefteq G$  es  $\phi(M) \trianglelefteq G$ . Así  $\phi(M) = 1$  pues  $K = 1$ . Por lo tanto  $\phi(B) = 1$  y como  $B$  es cíclico, debe ser  $|B| \leq p$  y  $|M/B| < |B| \leq p$  y como  $M/B$  es  $p$ -grupo, se sigue que  $M = B$ , luego  $M \leq A$  y como  $K = 1$ , debe ser  $M = 1$  y  $N = 1$  lo que no es posible.

Como consecuencia  $M$  no es abeliano y dado que  $M/N$  es cíclico debe ser  $N \not\leq Z(M)$ , así  $N \cap Z(M) < N$ , luego  $N \cap Z(M) = 1$  y  $Z(M) \cong Z(M)N/N$  cíclico. Por el resultado anterior como  $B$  es subgrupo abeliano de  $M$  y  $|M : B| < |B|$  se tiene que  $B \cap F(M) \neq 1$ . Ahora bien  $F(M) \leq F(G)$  así  $N$  centraliza a  $F(M)$  y  $B \cap F(M)$  es un subgrupo no trivial central de  $BN = M$ . Puesto que  $Z(M)$  es cíclico,  $B \cap F(M) \text{car } Z(M) \trianglelefteq G$ , por lo que  $B \cap Z(M)$  es un subgrupo normal no trivial de  $G$  contenido en  $A$ , lo que no es posible.

**Corolario 6.** (Horosevskii). Sea  $\sigma \in \text{Aut}(G)$ ,  $G \neq 1$ , entonces  $o(\sigma) < |G|$ .

**Demostración:** Considerar el producto semidirecto  $\langle \sigma \rangle \times_i G$ . Por el teorema anterior se tiene que  $|\langle \sigma \rangle : K| < |\langle \sigma \rangle \times_i G : \langle \sigma \rangle|$ , con  $K = \text{core}_{\langle \sigma \rangle \times_i G} \langle \sigma \rangle$ . Como  $K \cap G \leq \langle \sigma \rangle \cap G = 1$ , cada elemento de  $K$  centraliza a cada elemento de  $G$ , luego  $K = 1$  y  $o(\sigma) = |\langle \sigma \rangle| < |G|$ .

## Lección 5. El teorema de Schur-Zassenhaus.

Los grupos considerados son finitos.

La búsqueda de complementos de subgrupos normales de un grupo tiene una gran importancia en la teoría de grupos. El teorema de Schur-Zassenhaus afirma la existencia y conjugación de tales complementos si se cumple que  $(|N|, |G/N|) = 1$ . Comenzamos analizando el caso  $N$  abeliano.

Previamente recordar que si  $G$  actúa sobre un conjunto  $\Omega$ ,  $a \in \Omega$  y  $g \in G$  se tiene que  $G_a^g = G_{ag}$ . Así si la acción es transitiva, todos los estabilizadores son conjugados en  $G$ . Además si  $N \trianglelefteq G$  y  $N$  actúa transitivamente sobre  $\Omega$ , dados  $a \in \Omega$  y  $g \in G$  existe  $n \in N$  tal que  $ag = an$  luego  $gn^{-1} \in G_a$  es decir  $g \in NG_a$ , por lo tanto  $G = NG_a$ .

Sea  $\mathcal{S}$  el conjunto de todos los transversales de  $N$  en  $G$ . Si  $R, S \in \mathcal{S}$ , definamos:

$$R|S = \sqcap rs^{-1} (\in N)$$

donde  $(r, s) \in R \times S$  y  $Nr = Ns$ .

Notar que como  $N \trianglelefteq G$  no hace falta distinguir entre transversal a izquierda o a derecha. Además en la definición de  $R|S$ , no importa el orden de los factores, dado que  $N$  es abeliano.

Para  $R, S, T \in \mathcal{S}$  se tiene:

- 1)  $(R|S)^{-1} = S|R$
- 2)  $(R|S)(S|T) = R|T$

Si  $R \in \mathcal{S}$  y  $g \in G$ , entonces  $gR \in \mathcal{S}$ . En efecto si  $x \in G$ , existen  $r \in R$  y  $n \in N$  tales que  $x = rn = g(g^{-1}rn) = gr'n'$  siendo  $g^{-1}rN = r'N$ ,  $r' \in R$ . Además si  $grN = gr'N$  se sigue que  $rN = r'N$  luego  $r = r'$  y  $G$  es unión disjunta de las clases  $grN$  cuando  $r$  recorre  $R$ . Así puede definirse una acción de  $G$  sobre el conjunto  $\mathcal{S}$  :

$$\rho : G \longrightarrow \Sigma(\mathcal{S})$$

siendo  $\rho(g)(R) = g^{-1}R$ . Es sencillo comprobar que  $\rho$  es un homomorfismo de grupos.

3) Si  $n \in N$  se tiene:

$$nR|S = n^{|G:N|}R|S$$

Como  $xR|xS = \sqcap xrs^{-1}x^{-1} = x(R|S)x^{-1}$ , se tiene:

4) Si  $x \in G$  se tiene:  $R|S = 1 \Leftrightarrow xR|xS = 1$

Supongamos ahora que además  $(|N|, |G/N|) = 1$  y definamos  $\alpha : N \rightarrow N$  dada por  $\alpha(n) = n^{|G:N|}$ , es claro que  $\alpha$  es un homomorfismo y como existen enteros  $z, z'$  tales que  $1 = z|N| + z'|G : N|$  se tiene que  $n = n^{z'|G:N|}$  luego si  $n^{|G:N|} = 1$  se tiene que  $n = 1$ . Así  $\alpha \in \text{Aut}(N)$ .

5) Dados  $R, S \in \mathcal{S}$  sea  $n = \alpha^{-1}((R|S)^{-1})$ , entonces

$$nR|S = n^{|G:N|}R|S = \alpha(\alpha^{-1}(R|S)^{-1})R|S = 1$$

6) Si  $n \in N$  y  $R|S = 1 = nR|S$  entonces:

$$1 = nR|S = n^{|G:N|}R|S = n^{|G:N|} \Rightarrow n = 1$$

Las afirmaciones 1) a 6) son necesarias para probar el siguiente resultado.

**Teorema 1.** Sea  $N \trianglelefteq G$ ,  $N$  abeliano, tal que  $(|N|, |G/N|) = 1$ , entonces  $N$  tiene complemento en  $G$  y dos complementos cualesquiera de  $N$  en  $G$  son conjugados en  $G$ .

**Demostración:** Se define en  $\mathcal{S}$  la relación:

$$R \sim S \text{ si } R|S = 1$$

Por 1) y 2) dicha relación es de equivalencia. Sea  $[R]$  la clase de equivalencia de  $R$  y  $\mathcal{S}/\sim$  el conjunto de dichas clases. Se define una acción de  $G$  sobre dicho conjunto :

$$\tilde{\rho} : G \rightarrow \Sigma(\mathcal{S}/\sim)$$

en la forma  $\tilde{\rho}(g)([R]) = [g^{-1}R]$ . Notar que por 4):

$$[R] = [S] \Leftrightarrow R|S = 1 \Leftrightarrow g^{-1}R|g^{-1}S = 1 \Leftrightarrow [g^{-1}R] = [g^{-1}S]$$

Es claro que  $\tilde{\rho}$  es un homomorfismo de grupos.

Por 5) dados  $[R], [S]$  existe  $n \in N$  tal que  $\tilde{\rho}(n^{-1}) = [nR] = [S]$ , es decir que  $N$  actúa transitivamente sobre  $\mathcal{S}/\sim$ . Veamos el estabilizador en  $N$  de un elemento de dicho conjunto. Suponer que existe  $n \in N$  tal que  $\tilde{\rho}(n)([R]) = [n^{-1}R] = [R]$ . Entonces  $R|R = 1 = n^{-1}R|R$ . Por 6) se tiene que  $n = 1$  y por tanto dicho estabilizador es trivial. Así el estabilizador de  $[R]$  en  $G$  es un complemento de  $N$  en  $G$ .

Sea ahora  $H$  un complemento de  $N$  en  $G$ .  $H$  es un transversal de  $N$  en  $G$ . Como  $hH = H \forall h \in H$  se tiene que  $hH|H = 1$  luego  $\tilde{\rho}(h^{-1})([H]) = [hH] = [H]$  es decir  $H$  es un subgrupo del estabilizador de  $[H]$  en  $G$  y necesariamente deben coincidir.

Finalmente, sabemos que todos los estabilizadores en  $G$  son conjugados en  $G$ .

Pasamos a demostrar el caso general.

**Teorema 2** (Schur-Zassenhaus).

- a) Sea  $N \trianglelefteq G$  tal que  $(|N|, |G/N|) = 1$ , entonces  $N$  tiene complemento en  $G$ .
- b) Si además  $N$  ó  $G/N$  es resoluble, dos complementos cualesquiera de  $N$  en  $G$  son conjugados en  $G$ .

**Demostración :**

a) Sea  $G$  un contraejemplo de orden minimal.

1)  $N$  es nilpotente.

Sea  $P \in \text{Syl}_p(N)$ . Por el argumento de Frattini se tiene que  $G = NN_G(P)$ . Si  $N_G(P) < G$ ,  $N \cap N_G(P)$  tendría complemento  $D$  en  $N_G(P)$  y  $|D| = |N_G(P)/N_G(P) \cap N| = |G/N|$  por lo que  $D$  sería complemento de  $N$  en  $G$ , lo que no es posible. Así que  $N_G(P) = G$  y por el Teorema 8 de la Lección 1 se sigue que  $N$  es nilpotente.

2)  $N$  es abeliano.

Si  $N' \neq 1$ , como  $|G/N'| < |G|$ , sea  $M/N'$  un complemento de  $N/N'$  en  $G/N'$ . Así  $|M/N'| = |G/N'/N/N'| = |G/N|$  y  $|M| = |M/N'| |N'| = |G/N| |N'| < |G|$  pues  $N' < N$ . Por tanto existirá un complemento de  $N'$  en  $M$  de orden  $|G/N|$  y llegaríamos a contradicción. Así  $N$  es abeliano y aplicando el Teorema 1 llegaríamos a la contradicción final.

b) De nuevo podemos suponer que  $G$  es un contraejemplo de orden minimal.

Si  $N$  es resoluble se tiene que  $N' < N$ . Si  $N' = 1$ ,  $N$  es abeliano y basta aplicar el Teorema 1 para llegar a una contradicción. Si  $N' \neq 1$  sean  $D_1, D_2$  complementos de  $N$  en  $G$ . Se tiene:

$$|D_i N' / N'| = |D_i / D_i \cap N'| = |D_i| = |G/N| = |G/N' / N/N'|$$

luego los  $D_i N' / N'$  son complementos de  $N/N'$ , luego son conjugados y existe  $x \in G$  tal que  $D_2 N' = (D_1 N')^x = D_1^x N'$  y como  $D_1^x$  y  $D_2$  son complementos de  $N'$  en  $D_2 N'$  y

$|D_2N'| < |G|$ , se sigue que son conjugados en  $D_2N'$ , así  $D_2 = (D_1^x)^y = D_1^{xy}$ , que es una contradicción.

Si  $G/N$  es resoluble sea  $M/N \trianglelefteq G/N$ . Si  $M < G$  como  $M = M \cap D_iN = N(M \cap D_i)$  y  $M/N$  es resoluble existirá  $x \in M$  tal que  $D_2 \cap M = (D_1 \cap M)^x = D_1^x \cap M$ . Podemos suponer que  $D_2 \cap M = D_1 \cap M = H \neq 1$ . Entonces  $D_i \leq N_G(H)$   $i = 1, 2$  y  $N_G(H) = D_i(N_G(H) \cap N)$  y

$$N_G(H)/H = (D_i/H)(N_G(H) \cap N)H/H$$

con  $D_i \cap (N_G(H) \cap N)H = H$ , luego los  $D_i/H$  son complementos y como  $|N_G(H)/H| < |G|$  y

$$N_G(H)/H/(N_G(H) \cap N)H/H \cong N_G(H)/(N_G(H) \cap N)H = N_G(H)/N_G(H) \cap HN \cong$$

$$\cong N_G(H)N/HN \cong N_G(H)N/N/HN/N$$

que es resoluble, se seguiría que los  $D_i$  son conjugados en  $G$ , lo que no es posible.

Si  $M = G$  es que  $G/N$  es simple y resoluble, luego  $G/N \cong C_p$  para algún primo  $p$  y como  $p \nmid |N|$ , los complementos son  $p$ -subgrupos de Sylow de  $G$ , que sabemos que son conjugados en  $G$ , lo que es la contradicción final.

Como  $(|N|, |G/N|) = 1$  alguno de los órdenes es impar, luego, por el teorema de Feit-Thompson,  $N$  ó  $G/N$  es resoluble, por lo que en la parte b) del Teorema anterior podría suprimirse dicha condición.

## Lección 6. Acción coprime.

Para facilitar la exposición, supondremos que los grupos considerados son finitos.

Sea  $G$  un grupo sobre el que actúa un grupo  $A$  ( $G$  es un  $A$ -grupo). Se definen dos subgrupos de  $G$  en la forma siguiente:

$$[G, A] = \langle [g, a] \mid g \in G, a \in A \rangle$$

siendo  $[g, a] = g^{-1}g^a$ ,

$$C_G(A) = \{g \in G \mid g^a = g, \forall a \in A\}$$

Es sencillo probar que  $[G, A]$  es un subgrupo normal  $A$ -invariante de  $G$ . En efecto, si  $x \in G$

$$(g^{-1}g^a)^x = x^{-1}g^{-1}g^ax = x^{-1}g^{-1}g^ax^ax^{-a}x = (gx)^{-1}(gx)^a(x^{-1}x^a)^{-1} \in [G, A]$$

Si  $a_1 \in A$ :

$$(g^{-1}g^a)^{a_1} = g^{-a_1}g^{aa_1} = g^{-a_1}gg^{-1}g^{aa_1} = (g^{-1}g^{a_1})^{-1}g^{-1}g^{aa_1} \in [G, A]$$

Es claro que  $C_G(A)$  es  $A$ -invariante, pero no necesariamente normal en  $G$ . Basta pensar en  $\langle \alpha \rangle$  actuando sobre  $\Sigma_3$  en la forma

$$\alpha((1, 2, 3)) = (1, 3, 2), \alpha((1, 2)) = (1, 2)$$

entonces  $C_{\Sigma_3}(\langle \alpha \rangle) = \langle (1, 2) \rangle$  que no es normal en  $\Sigma_3$ .

Si  $G$  es un  $A$ -grupo y  $N \trianglelefteq G$ , es  $A$ -invariante, queda inducida una acción de  $A$  sobre  $G/N$  en la forma siguiente:

$$\tilde{\phi} : A \longrightarrow \text{Aut}(G/N)$$

$$\tilde{\phi}(a)(xN) = x^aN.$$

Diremos que  $A$  actúa coprimamente sobre  $G$  cuando  $(|A|, |G|) = 1$ .

Pasamos a demostrar un primer resultado sobre acción coprime que tiene muchas aplicaciones y que es una consecuencia del teorema de Schur-Zassenhaus.

**Teorema 1 (Lema de Glauberman).** Sea  $\pi$  un conjunto de números primos,  $A$  un  $\pi$ -grupo actuando sobre un  $\pi'$ -grupo  $G$  ( $A$  ó  $G$  resoluble). Suponer que ambos actúan sobre un conjunto  $\Omega$  de forma que:

- a)  $(\alpha g)a = (\alpha a)g^a$ , cualesquiera que sean  $\alpha \in \Omega, g \in G, a \in A$ .
- b)  $G$  es transitivo sobre  $\Omega$ .

Entonces  $A$  fija algún elemento de  $\Omega$  y  $C_G(A)$  actúa transitivamente sobre el conjunto de elementos fijados por  $A$ .

**Demostración:** Sea  $\Gamma = [G]A$  el producto semidirecto de  $G$  por  $A$  bajo la acción dada. Definimos una acción de  $\Gamma$  sobre  $\Omega$  en la forma:

$$\alpha(ag) = (\alpha a)g$$

En efecto, es una acción de  $\Gamma$  sobre  $\Omega$  ya que :

$$(\alpha(a_1g_1))(a_2g_2) = ((\alpha a_1)g_1)a_2g_2 = ((\alpha a_1)a_2)g_1^{a_2}g_2 = (\alpha(a_1a_2))g_1^{a_2}g_2$$

y

$$\alpha(a_1g_1)(a_2g_2) = \alpha(a_1a_2g_1^{a_2}g_2) = (\alpha(a_1a_2))g_1^{a_2}g_2$$

Sea  $\alpha \in \Omega$  y  $H = \Gamma_\alpha$ , entonces:

$$|\Omega| = |G : G_\alpha| = |G : G \cap \Gamma_\alpha| = |G : G \cap H| = |\Gamma : H|$$

pues la acción de  $\Gamma$  sobre  $\Omega$  será también transitiva.

Como  $G \cap H \leq H \leq \Gamma$  y  $G \cap H \leq G \leq \Gamma$ , se sigue por lo anterior que

$$|A| = |\Gamma : G| = |H : H \cap G|$$

y como  $H \cap G \trianglelefteq H$ , por el teorema de Schur-Zassenhaus existe  $D$  complemento de  $H \cap G$  en  $H$ . Como  $|D| = |A|$  será  $D$  complemento de  $G$  en  $\Gamma$  y de nuevo aplicando dicho teorema,  $D$  será conjugado con  $A$  en  $\Gamma$ . Así existe  $g \in G$  tal que  $A = D^g$ . Por tanto  $A \leq H^g = \Gamma_{\alpha g}$ .

Veamos ahora la acción transitiva de  $C_G(A)$  sobre el conjunto de elementos fijados por  $A$ . Sean  $\beta, \gamma$  elementos de  $\Omega$  fijados por  $A$ . Por b) sabemos que existe  $y \in G$  tal que  $\beta y = \gamma$  por lo tanto  $A, A^y \leq \Gamma_\gamma \leq \Gamma = [G]A$ , luego  $\Gamma_\gamma = G_\gamma A = G_\gamma A^y$  y por tanto  $A$  y

$A^y$  son conjugados en  $\Gamma_\gamma$ , luego existe  $z \in G_\gamma$  tal que  $A^z = A^y$  así  $yz^{-1}$  normaliza a  $A$ . Como consecuencia tenemos:

$$[\langle yz^{-1} \rangle, A] \leq A \cap G = 1$$

así que  $yz^{-1} \in C_G(A)$  y  $\beta yz^{-1} = \gamma z^{-1} = \gamma$ .

El siguiente resultado viene a decir que si  $A$  actúa coprimamente sobre  $G$  ( $A$  ó  $G$  resoluble) y  $N$  es un subgrupo normal  $A$ -invariante de  $G$ , los puntos fijos de  $G/N$  por la acción inducida provienen de los puntos fijos de  $G$ .

**Teorema 2.** Si  $A$  actúa coprimamente sobre  $G$  ( $A$  ó  $G$  resoluble) y  $N$  es un subgrupo normal  $A$ -invariante de  $G$ , entonces:

$$C_{G/N}(A) = C_G(A)N/N$$

**Demostración:** sea  $\Omega = \{Nx | x \in G\}$ .  $G$  actúa transitivamente sobre  $\Omega$  y  $A$  actúa en la forma inducida comentada en la introducción, de forma que:

$$(Nx)ga = (Nxg)a = N(xg)^a = Nx^a g^a = (Nx)ag^a$$

Por el lema de Glauberman sabemos que  $A$  fija algún elemento de  $\Omega$  y que  $C_G(A)$  actúa transitivamente sobre el conjunto de puntos fijos por  $A$ . Así al considerar  $N \in C_{G/N}(A)$  y hacer actuar  $C_G(A)$ , recorreremos todos los puntos fijos por  $A$  de  $G/N$ .

**Corolario 3.** Si  $A$  actúa coprimamente sobre  $G$  ( $A$  ó  $G$  resoluble) se tiene que

$$G = C_G(A)[G, A]$$

**Demostración:** Considerar a  $A$  actuando sobre  $G/[G, A]$ . Como  $x^{-1}x^a \in [G, A]$ , cualesquiera que sean  $x \in G, a \in A$ ,  $A$  fija a cada elemento de  $G/[G, A]$ , luego

$$G/[G, A] = C_{G/[G, A]}(A) = C_G(A)[G, A]/[G, A]$$

luego  $G = C_G(A)[G, A]$ .

**Ejercicio.** i) Si  $A, B \leq G$  se tiene que:  $[A, B] \triangleleft \langle A, B \rangle$ . ii) Si  $A, B, C$  son subgrupos de un grupo  $G$  y  $B \leq N_G(A) \cap N_G(C)$ , entonces:  $[AB, C] = [A, C][B, C]$ .

**Corolario 4.** Si  $A$  actúa coprimamente sobre  $G$  ( $A$  ó  $G$  resoluble) se tiene:

$$[G, A, A] = [G, A]$$

**Demostración:**  $[G, A] = [[G, A]C_G(A), A] = [[G, A], A]$ .

**Teorema 5.** Si  $A$  actúa coprimamente sobre  $G$  y  $G$  es abeliano entonces:

$$G = [G, A] \times C_G(A)$$

**Demostración:** Basta probar que  $[G, A] \cap C_G(A) = 1$ , para lo cual construiremos un endomorfismo  $\phi$  de  $G$  tal que  $\phi(x) = x$  para cada  $x \in C_G(A)$  y  $\phi(x) = 1$  para cada  $x \in [G, A]$ .

Sea  $|A| = n$ , como  $(n, |G|) = 1$ , la aplicación que asocia a cada elemento  $x \in G$  el elemento  $x^n$ , es un automorfismo  $\alpha$  de  $G$ . En efecto, como  $G$  es abeliano  $(xy)^n = x^n y^n$ , para cualesquiera  $x, y \in G$ . Además existen  $s, t \in \mathbf{Z}$  tales que  $1 = sn + t|G|$ , luego si  $x^n = 1$ ,  $x = x^{sn+t|G|} = 1$ . Considerar  $\alpha^{-1}$  y definir

$$\phi : G \longrightarrow G$$

en la forma:

$$\phi(x) = \alpha^{-1}\left(\prod_{a \in A} x^a\right)$$

Es claro que  $\phi$  es un endomorfismo de  $G$ . Además si  $x \in C_G(A)$  se tiene que  $\phi(x) = \alpha^{-1}(\alpha(x)) = x$  y si  $a_1 \in A$  se tiene:  $\phi(x^{a_1}) = \alpha^{-1}\left(\prod_{a \in A} x^{a_1 a}\right) = \phi(x)$ , luego  $\phi([x, a_1]) = \phi(x^{-1}x^{a_1}) = \phi(x)^{-1}\phi(x^{a_1}) = 1$ , así  $\phi(y) = 1$  para cualquier  $y \in [G, A]$ .

**Ejercicio.** (Lema de los tres subgrupos). Sean  $A, B, C$  subgrupos de un grupo  $G$ . Demostrar que si  $[A, B, C] = 1 = [B, C, A]$  entonces  $[C, A, B] = 1$ .

(Ayuda: usar la identidad de Hall-Witt:  $[a, b^{-1}, c]^b [b, c^{-1}, a]^c [c, a^{-1}, b]^a = 1$ , cualesquiera que sean  $a, b, c \in G$ .)

**Teorema 6 (El  $P \times Q$ - lema de Thompson).** Sean  $P, X$   $p$ -grupos,  $Q$   $p'$ -grupo siendo  $X$  un  $P \times Q$ -grupo. Si  $[C_X(P), Q] = 1$  entonces  $[X, Q] = 1$ .

**Demostración:** Suponer que  $[X, Q] \neq 1$  y sea  $X_0$  minimal en el conjunto de los subgrupos  $Y$   $P \times Q$ -invariantes de  $X$  que verifican  $[Y, Q] \neq 1$ .

Como  $X_0$  y  $P$  son  $p$ -grupos, el producto semidirecto  $[X_0]P$  también lo es y por los Teoremas 3 y 6 de la Lección 1 se tiene que  $[X_0, P] \leq [X_0, [X_0]P] < X_0$  y por la elección de  $X_0$  se sigue que  $[X_0, P, Q] = 1$  y como  $[P, Q, X_0] = 1$ , por el lema de los tres subgrupos se sigue que  $[Q, X_0, P] = 1$  luego  $[Q, X_0] \leq C_X(P)$  y por la hipótesis  $[X_0, Q, Q] = 1$  y por el Corolario 4 se concluye que  $[X_0, Q] = 1$ , lo que es una contradicción.

**Corolario 7.** Si  $P$  es un  $p$ -subgrupo de  $G$ , se tiene:

$$O_{p'}(N_G(P)) \leq C_G(O_p(G))$$

siendo  $O_{p'}(N_G(P))$  el mayor  $p'$ -subgrupo normal de  $G$ .

**Demostración.** Considerar  $X = O_p(G)$ ,  $Q = O_{p'}(N_G(P))$  y el  $p$ -subgrupo  $P$ . Como se verifican las hipótesis del  $P \times Q$ -lema, y  $[C_{O_p(G)}(P), O_{p'}(N_G(P))] \leq O_p(G) \cap O_{p'}(N_G(P)) = 1$ , sabemos que  $[O_p(G), O_{p'}(N_G(P))] = 1$ .

**Lema 8.** Sea  $P$  un  $p$ -subgrupo de  $G$  y  $K$  un  $p'$ -subgrupo normal de  $G$ . Entonces:

$$N_{G/K}(PK/K) = N_G(P)K/K$$

**Demostración:** Es claro que  $N_G(P)K/K \leq N_{G/K}(PK/K) = U/K$ . Ahora bien, como  $PK \trianglelefteq U$  y  $P \in \text{Syl}_p(PK)$ , por el argumento de Frattini se tiene que:

$$U = PKN_U(P) = KN_U(P) \leq KN_G(P) = N_G(P)K$$

.

A continuación probaremos que si  $G$  es resoluble puede obtenerse un resultado más fuerte que el obtenido en el Corolario 7.

**Teorema 9.** Sea  $G$  resoluble y  $P$  un  $p$ -subgrupo de  $G$ . Denotar con  $C = C_G(P)$  y con  $N = N_G(P)$ . Entonces

$$O_{p'}(C) = O_{p'}(N) \leq O_{p'}(G)$$

**Demostración:** Como  $O_{p'}(C) \text{car} C \trianglelefteq N$  es  $O_{p'}(C) \leq O_{p'}(N)$ . Además  $[O_{p'}(N), P] = 1$ , así que  $O_{p'}(N) \leq C$  y por lo tanto  $O_{p'}(N) \leq O_{p'}(C)$ .

Veamos ahora que uno de tales subgrupos es subgrupo del  $p'$ -radical de  $G$ . La demostración será por inducción sobre  $|G|$ .

Si  $K = O_{p'}(G) \neq 1$ , se tiene que  $|G/K| < |G|$  y por hipótesis de inducción se tiene que:

$$O_{p'}(N_{G/K}(PK/K)) \leq O_{p'}(G/K) = 1$$

Por el lema anterior sabemos que  $N_{G/K}(PK/K) = N_G(P)K/K$ , así que

$$O_{p'}(N_G(P))K/K \leq O_{p'}(N_G(P)K/K) = 1$$

por tanto  $O_{p'}(N_G(P)) \leq K = O_{p'}(G)$ .

Suponer ahora que  $K = 1$ . Así  $F(G) = O_p(G)$  y como  $G$  es resoluble, por el Teorema 6 de la Lección 2 sabemos que  $C_G(O_p(G)) \leq O_p(G)$ . Por el Corolario anterior se tiene que

$$O_{p'}(N_G(P)) \leq C_G(O_p(G)) \leq O_p(G)$$

y así  $O_{p'}(N_G(P)) = 1$ .

## Lección 7. Preliminares del $p^a q^b$ -Teorema de Burnside.

**Teorema 1.** Sea  $P$  un  $p$ -grupo que a lo más tiene un subgrupo de orden  $p$ . Si  $p = 2$  suponer además que  $P$  es abeliano. Entonces  $P$  es cíclico.

**Demostración:** Por el Teorema 11 de la Lección 1 (Teorema de estructura de los grupos finitos abelianos) se sigue que si  $P$  es abeliano, necesariamente  $P$  será cíclico, por lo tanto podemos suponer que  $|P| \geq p^3$ . Procederemos por inducción sobre  $|P|$ .

Si  $|P| = p^3$ , supongamos que  $P$  no es cíclico, luego  $P$  no es abeliano (luego  $p$  impar), así que  $P' = Z(P) \cong C_p$  y  $P/Z(P) \cong C_p \times C_p$ , luego  $P/Z(P) = X/Z(P) \times Y/Z(P)$  con  $|X/Z(P)| = |Y/Z(P)| = p$ . Ambos  $X, Y$  tienen por tanto orden  $p^2$ , luego serán cíclicos. Sea  $X = \langle x \rangle$ ,  $Y = \langle y \rangle$ , entonces  $X \cap Y = \langle x^p \rangle = \langle y^p \rangle = Z(P)$ , el único subgrupo de orden  $p$  de  $P$ . Como  $y^{-p} = (x^p)^m = (x^m)^p$  para algún  $m$ ,  $1 \leq m < p$ , podemos suponer que  $x^p y^p = 1$ . Como  $[x, y] \in P' = Z(P)$  se tiene que  $[x, y] = 1$  ó  $o([x, y]) = p$ . Sabemos que:

$$(xy)^p = x^p y^p [y, x]^{p(p-1)/2}$$

Como  $p$  es impar  $2|p-1$  luego  $(xy)^p = 1$ , pero  $xy \notin X \cap Y$  lo que es una contradicción.

Pasamos al caso general. Sea  $N \triangleleft P$ . Entonces  $N \leq Z(P)$  y  $|N| = p$ . Considerar  $P/N$  y suponer que existen dos subgrupos de orden  $p$ :  $R/N$  y  $S/N$ . Supongamos, sin pérdida de generalidad que  $R/N \leq Z(P/N)$ , entonces  $RS$  es un subgrupo de  $P$  de orden  $p^3$  con un único subgrupo de orden  $p$  y además, si  $p = 2$ , es abeliano. Por la parte anterior, sabemos que  $RS$  es cíclico, luego tiene un único subgrupo de orden  $p^2$ , así  $R = S$  lo que no es posible. Ahora, por hipótesis de inducción,  $P/N$  es cíclico, luego  $P/Z(P)$  es también cíclico, por lo tanto  $P$  es abeliano y por la hipótesis es cíclico.

Es una consecuencia inmediata que un  $p$ -grupo  $P$  no cíclico de orden impar contiene un subgrupo isomorfo a  $C_p \times C_p$ , pues  $Z(P)$  siempre contiene un elemento de orden  $p$ .

**Lema 2.** Sea  $P$   $p$ -elemental abeliano no cíclico actuando sobre un  $q$ -elemental abeliano  $Q$ . Entonces existe  $g \neq 1, g \in P$  tal que  $C_Q(g) \neq 1$ .

**Demostración:** Supongamos sin pérdida de generalidad que  $|P| = p^2$ , es decir que  $P \cong C_p \times C_p$ .  $P$  tiene  $p^2 - 1/p - 1$  subgrupos de orden  $p$  y  $P = \cup P_i$  donde  $P_i$  recorre tales

subgrupos. Consideremos a  $Q$  como  $\mathbf{Z}/q\mathbf{Z}$ -espacio vectorial. Suponer que la tesis es falsa, así si  $1 \neq g \in P$  y  $x \in Q$  tal que  $x^g = x$  entonces  $x = 0$  (utilizamos notación aditiva en  $Q$ ).

Sea  $0 \neq y \in Q$  y  $1 \neq h \in P$ , entonces

$$\left(\sum_{g \in P} y^g\right)^h = \sum_{g \in P} y^{gh} = \sum_{g \in P} y^g$$

luego  $\sum_{g \in P} y^g = 0$ . Lo mismo sucede para  $P_i$  en lugar de  $P$ ,  $i = 1, \dots, p+1$ , así:

$$0 = \sum_{g \in P} y^g = \sum_{i=1}^{p+1} \left(\sum_{g \in P_i} y^g\right) - py = -py$$

pero como  $o(y) = q$ , se sigue  $p = q$ . Entonces el producto semidirecto asociado  $G = [Q]P$  es un  $p$ -grupo y sabemos que  $Q \cap Z(G) \neq 1$ , lo que no es posible.

**Lema 3.** Sean  $p, q$  primos tales que  $p \neq q$  y sea  $P$   $p$ -elemental abeliano no cíclico actuando sobre un  $q$ -grupo  $Q$ . Si

$$\eta(Q) = \langle C_Q(W) \mid W \leq P, |P : W| = p \rangle$$

entonces  $Q = \eta(Q)$ . En particular

$$Q = \langle C_Q(x) \mid 1 \neq x \in P \rangle$$

**Demostración:** Por inducción sobre  $|P| + |Q|$ .

Suponer primero que  $Q$  tiene un subgrupo normal  $P$ -invariante no trivial propio  $Q_0$ . sea  $W \leq P$  tal que  $|P : W| = p$ . Por el Teorema 2 de la Lección 6 sabemos que :

$$C_{Q/Q_0}(W) = C_Q(W)Q_0/Q_0$$

así que  $\eta(Q/Q_0) \leq \eta(Q)Q_0/Q_0$  y como  $|Q/Q_0| < |Q|$ , se sigue por hipótesis de inducción que  $\eta(Q/Q_0) = Q/Q_0$  y por tanto que  $Q = \eta(Q)Q_0$ . Asimismo, como  $|Q_0| < |Q|$  es  $Q_0 = \eta(Q_0) \leq \eta(Q)$ , luego  $Q = \eta(Q)$ .

Supongamos ahora que  $Q$  no posee subgrupos  $P$ -invariantes normales distintos de 1 y de  $Q$ . Así  $Q$  es característicamente simple luego  $\phi(Q) = 1$  y por tanto  $Q$  es  $q$ -elemental

abeliano. Por el lema anterior existe  $1 \neq x \in P$  tal que  $C_Q(x) \neq 1$ . Como  $P$  es abeliano,  $C_Q(x)$  es  $P$ -invariante y por la hipótesis es  $Q = C_Q(x)$ . Podemos definir una acción en forma natural de  $\bar{P} = P / \langle x \rangle$  sobre  $Q$ .

Si  $\bar{P}$  es cíclico es  $|\bar{P}| = p$  y  $Q = C_Q(x) \leq \eta(Q)$ .

Si  $\bar{P}$  no es cíclico, por hipótesis de inducción se tiene:

$$Q = \langle C_Q(\bar{W}) \mid |\bar{P} : \bar{W}| = p \rangle \leq \langle C_Q(W) \mid |P : W| = p \rangle = \eta(Q)$$

Hemos probado que  $Q$  viene generado por los subgrupos de puntos fijos de los subgrupos maximales de  $P$ . Es claro que si  $1 \neq x \in P$ ,  $\langle x \rangle < P$ , pues  $P$  no es cíclico y existirá  $M < P$  tal que  $\langle x \rangle \leq M$  luego  $C_Q(M) \leq C_Q(\langle x \rangle)$  así en particular  $Q = \langle C_Q(x) \mid 1 \neq x \in P \rangle$ .

**Lema 4.** Sean  $p, q$  primos tales que  $p \neq q$ , ambos impares,  $P$  un  $p$ -subgrupo y  $Q$  un  $q$ -subgrupo de  $G = \text{GL}(2, q)$ . Si  $Q \leq N_G(P)$  entonces  $Q \leq C_G(P)$ .

**Demostración:** Notar que  $Q$  actúa coprimamente sobre  $P$ , así por el Corolario 4 de la Lección 6 :  $[[P, Q], Q] = [P, Q, Q] = [P, Q]$ , luego bastará probar que  $Q$  centraliza a  $P_0 = [P, Q] \trianglelefteq PQ$ ,  $P_0 \leq P$ . Es claro que  $P_0 \leq [G, G] \leq \text{SL}(2, q)$  ya que :

$$\text{GL}(2, q)/\text{SL}(2, q) \cong \text{GF}(q)^* \cong C_{q-1}$$

Sea  $V$  un  $\text{GF}(q)$ -espacio vectorial 2-dimensional y consideremos a  $\text{GL}(2, q)$  actuando como es habitual sobre  $V$ . Supongamos que existen  $x \in P_0$  y  $v \in V$  tales que  $v^x = v \neq 0$ .

Sea  $(v, w)$  base de  $V$  y  $X = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$  la matriz coordenada de  $x$  en dicha base. Como  $\det(X) = 1$  es  $b = 1$  y así  $X^q = I$  luego  $x = 1$  pues  $P_0$  es  $q'$ -grupo. Por el Lema 2  $P_0$  no contiene subgrupos elementales abelianos no cíclicos así, por la nota posterior al Teorema 1,  $P_0$  es cíclico. Como  $p \mid |\text{GL}(2, q) - 1| = (q^2 - 1)(q^2 - q) = q(q - 1)^2(q + 1)$  y  $q \neq 2$  se tiene que  $p < q$ . Sea  $|P_0| = p^a$ ,  $a \geq 1$  entonces  $|\text{Aut} P_0| = p^{a-1}(p - 1)$  que no es divisible por  $q$ . Como cada elemento de  $Q$  induce un automorfismo de  $P_0$  de orden potencia de  $q$ , se concluye por el Corolario 4 de la Lección 6 que:

$$[P_0, Q] = 1 = [P, Q, Q] = [P, Q]$$

es decir  $Q \leq C_G(P)$ .

**Lema 5.** Sea  $q$  un primo impar,  $V$   $q$ -elemental abeliano y  $H$  un grupo de automorfismos resoluble de  $V$ . Suponer  $|H|$  impar y  $O_q(H) = 1$ . Si  $h$  es un  $q$ -elemento de  $H$  tal que  $|V : C_V(h)| \leq q$  entonces  $h = 1$ .

**Demostración:** Podemos suponer que  $|V : C_V(h)| = q$  pues si  $|V : C_V(h)| = 1$  sería  $h = 1$ . También podemos suponer que  $o(h) = q$ , ya que si  $o(h) = q^a$ ,  $a > 1$  consideraríamos  $h^{q^{a-1}}$ ,  $o(h^{q^{a-1}}) = q$  y como  $C_V(h) \leq C_V(h^{q^{a-1}}) < V$ , pues  $h^{q^{a-1}} \neq 1$ , se tendría  $C_V(h) = C_V(h^{q^{a-1}})$ .

Sea  $H$  contraejemplo de orden minimal y  $Q = \langle h \rangle$ . Como  $O_q(H) = 1$ ,  $F(H)$  es un  $q'$ -grupo. Como  $H$  es resoluble, por el Teorema 6 a) de la Lección 2  $C_H(F(H)) \leq F(H)$  y existe  $p \in \pi(H)$ ,  $p \neq q$ , tal que  $[O_p(H), Q] \neq 1$  (notar que también  $p$  es impar pues  $|H|$  es impar). Sea  $P = O_p(H)$ , entonces  $O_q(PQ) = 1$ . Por la elección de  $H$ , debe de ser  $H = PQ$ . Como  $Q$  no es un subgrupo normal de  $H$  tomamos  $x \in H - N_H(Q)$ , así  $Q$  y  $Q^x$  son  $q$ -subgrupos de Sylow de  $H$ ,  $Q \neq Q^x$ , luego también de  $\langle Q, Q^x \rangle$  y como  $O_q(\langle Q, Q^x \rangle) \leq Q \cap Q^x = 1$ , de nuevo, por la elección de  $H$ , se tiene que  $H = \langle Q, Q^x \rangle$ . así  $C_V(H) = C_V(Q) \cap C_V(Q^x)$  y :

$$|V : C_V(H)| \leq |V : C_V(Q)| |V : C_V(Q^x)| = q^2$$

Como  $V$  es abeliano  $C_V(H) \trianglelefteq V$ . Además  $H$  se representa fielmente sobre  $W = V/C_V(H)$ . En efecto si  $L = \text{Ker}(H \text{ sobre } W)$ ,  $[L, W] = 1 \implies [L, V] \leq C_V(H) \implies [L, V, L] = 1 \implies [V, L \cap P, L \cap P] = 1 = [V, L \cap P]$ , por el Corolario 4 de la Lección 6. Por lo tanto  $L \cap P = 1$  y  $|L| = |LP/P|$ , que divide a  $|H : P| = q$ , luego  $L \leq O_q(H) = 1$ .

En consecuencia,  $H$  es isomorfo a un subgrupo de  $\text{GL}(2, q)$  y por el resultado anterior es  $[P, Q] = 1$ , lo que es una contradicción.

## Lección 8. Demostración del $p^a q^b$ -Teorema de Burnside.

**Teorema.** Sea  $G$  un grupo de orden  $p^a q^b$ ,  $p, q$  primos, entonces  $G$  es resoluble.

**Demostración:** (Bender) Si  $G$  es contraejemplo de orden minimal, analizaremos su estructura en varios pasos hasta llegar a que no puede existir dicho grupo.

1.  $G$  es un grupo simple no abeliano cuyos subgrupos propios son todos resolubles.

En efecto  $G$  no es abeliano y si  $1 \neq N \triangleleft G$ , la elección de  $G$  fuerza a que tanto  $N$  como  $G/N$  son resolubles luego  $G$  es resoluble, lo que no es posible. Además si  $H < G$  por la misma razón  $H$  es resoluble.

Necesariamente  $p \neq q$  y podemos suponer que  $p < q$ . En la demostración  $\{r, s\}$  denotará el par no ordenado  $\{p, q\}$ .

2. Si  $G$  tiene subgrupos  $A, B$  tales que  $G = AB$  y  $A \neq G$ , entonces  $B$  no normaliza a cualquier subgrupo no trivial de  $A$ .

Suponer que  $B \leq N_G(H)$  siendo  $1 \neq H \leq A$ . Entonces:

$$1 \neq H^G = H^{BA} = H^A \leq A < G$$

donde  $H^G$  denota la envoltura normal de  $H$  en  $G$ . Como  $H^G \triangleleft G$ , esto no es posible por 1.

3. Si  $R \in \text{Syl}_r(G)$ ,  $R$  no normaliza a un  $s$ -subgrupo no trivial de  $G$ .

Si  $1 \neq H \leq G$  es un  $s$ -subgrupo de  $G$  y  $R \leq N_G(H)$ , como existe  $S \in \text{Syl}_s(G)$  tal que  $H \leq S$  y  $G = RS$  basta aplicar 2 para concluir que dicha suposición no puede darse.

4. Si  $S \in \text{Syl}_s(G)$ ,  $1 \neq Y \trianglelefteq R \in \text{Syl}_r(G)$ , entonces  $G = \langle S, Y \rangle$ .

En efecto, sea  $1 \neq z \in Y \cap Z(R)$ . Considerar los subgrupos  $\langle S, z \rangle$  y  $C_G(z)$ . Como  $R \leq C_G(z)$  es  $G = \langle S, z \rangle C_G(z)$  y dado que  $C_G(z)$  normaliza al subgrupo no trivial  $\langle z \rangle$  de  $\langle S, z \rangle$ , concluimos por 2 que debe ser  $G = \langle S, z \rangle = \langle S, Y \rangle$ .

5. Sean  $M, H$  subgrupos maximales de  $G$ . Suponer que existen  $R$   $r$ -subgrupo normal de  $M$  y  $S$   $s$ -subgrupo normal de  $M$  no triviales de forma que  $R \times S \leq H$ , entonces:

i)  $R \times S \leq F(H) \leq M$

ii)  $M = H$

Como  $M \leq N_G(R) \leq G$ , por la maximalidad de  $M$  y por 1 se sigue que  $M = N_G(R)$ . Análogamente  $M = N_G(S)$ .

Por otra parte:

$$S \leq C_H(R) \leq C_G(R) \leq N_G(R) = M$$

así que  $S \leq C_H(R)$ . Por el Teorema 9 de la Lección 6 sabemos que:

$$O_{r'}(C_H(R)) = O_{r'}(N_H(R)) \leq O_{r'}(H) = O_s(H)$$

pues  $H$  es resoluble. Por tanto  $1 \neq S \leq O_s(H)$ . Análogamente  $1 \neq R \leq O_r(H)$ . Así  $R \times S \leq O_r(H) \times O_s(H) = F(H)$ . Además  $O_r(H) \leq C_G(S) \leq M$  y también  $O_s(H) \leq C_G(R) \leq M$  por lo tanto  $F(H) \leq M$ .

Considerando ahora que, según hemos probado,  $O_r(H) \times O_s(H) \leq M$ , intercambiando los papeles de  $M$  y  $H$  se concluye que:

$$F(H) = O_r(H) \times O_s(H) \leq F(M) \leq H$$

Finalmente repitiendo lo que hemos hecho al principio con  $R = O_r(M)$  y  $S = O_s(M)$ , concluiremos que  $F(M) \leq F(H)$  y por tanto que:

$$F(M) = F(H)$$

Por tanto:  $M = N_G(F(M)) = N_G(F(H)) = H$

6. Sea  $M < .G$ , entonces  $F(M)$  tiene orden potencia de un primo.

Supongamos que  $O_r(M) \neq 1 \neq O_s(M)$  y lleguemos a contradicción.

Sean  $1 \neq R_0 = Z(O_r(M))$  y  $1 \neq S_0 = Z(O_s(M))$ . Es claro que  $R_0, S_0 \leq Z(F(M))$ . Sea  $1 \neq x \in F(M)$ , entonces  $R_0 \leq C_G(x) < G$  y  $S_0 \leq C_G(x) < G$ , así existe  $H < .G$  tal que  $R_0 \times S_0 \leq C_G(x) \leq H < G$ . Por 5 sabemos que  $H = M$ , así que

$$C_G(x) \leq M, \forall 1 \neq x \in F(M)$$

Veamos que  $R_0$  es cíclico. Si no fuera así, por el Teorema 11 de la Lección 1, existiría  $T \leq R_0$  tal que  $T \cong C_r \times C_r$ .

Sea  $R \in \text{Syl}_r(M)$ . Como  $R \leq N_G(S_0)$ , por 3 no puede ser  $R$  un  $r$ -subgrupo de Sylow de  $G$ . Así existe  $P \in \text{Syl}_r(G)$  tal que  $R < P$  luego  $R < N_P(R)$ . Sea  $g \in N_P(R) - R$ . Entonces  $g \notin M$  pues si  $g \in M$ ,  $R << g > R$ ,  $r$ -subgrupo de  $M$ , lo que no es posible. Así:

$$T \leq R_0 \leq R = R^g \leq M^g \neq M$$

pues  $M = N_G(M)$ . por lo tanto  $T$  normaliza a  $S_0^g \trianglelefteq M^g$ . Llamemos  $S = S_0^g$ . Como  $T$  es un  $r$ -elemental abeliano no cíclico actuando sobre  $S$ , que es un  $s$ -grupo, por el Lema 3 de la Lección 7 sabemos que:

$$S = \langle C_S(x) \mid 1 \neq x \in T \rangle \leq \langle C_G(x) \mid 1 \neq x \in T \rangle \leq M$$

Además, como  $R_0 \leq R$ , se tiene:  $R_0^g \leq R^g = R \leq M^g$  y  $M$  contiene a  $R_0^g \times S_0^g \trianglelefteq M^g$ . Por 5 se tiene que  $M = M^g$ , lo que no es cierto.

Concluimos que  $R_0$  es cíclico y análogamente  $S_0$  es cíclico.

Concretando,  $P_0 = Z(O_p(M))$  es cíclico. Suponer que  $|P_0| = p^c$ , entonces  $|\text{Aut}(P_0)| = p^{c-1}(p-1)$ . Sea  $Q \in \text{Syl}_q(M)$  actuando por conjugación sobre  $P_0$ . Como el grupo de automorfismos de  $P_0$  inducido por  $Q$  es un  $q$ -grupo y  $p < q$  dicho grupo debe ser trivial. Así  $Q$  centraliza a  $P_0$  y  $P_0 \times Q_0 \leq N_G(Q)$  siendo  $1 \neq Q_0 = Z(O_q(M))$ . Por 5 se sigue que  $N_G(Q) \leq M$ . Por la cuestión 11 de Teoría de Sylow, sabemos que  $Q \in \text{Syl}_q(G)$ , lo que no es posible por 3, dado que  $Q \leq N_G(P_0)$ .

7. Sea  $t$  un primo y  $E$  un grupo finito. Un  $t$ -subgrupo  $U$  de  $E$  se dice **localmente central en  $E$**  si  $U \leq Z(T)$ , siendo  $T$  algún  $t$ -subgrupo de Sylow de  $E$ . Notar que el centro de cualquier  $t$ -subgrupo de Sylow de  $E$  es ejemplo de localmente central y que si  $U$  es  $t$ -localmente central,  $C_E(U)$  contiene un  $t$ -subgrupo de Sylow de  $E$ . La existencia de subgrupos localmente centrales no triviales en subgrupos maximales de  $G$ , suministrará una información importante sobre la estructura de  $G$ .

8. (Matsuyama) Si  $M < G$  contiene algún  $r$ -subgrupo no trivial  $Y$  localmente central en  $G$  entonces  $F(M)$  es un  $r$ -grupo.

Supongamos que  $F(M)$  no es un  $r$ -grupo. Por el paso 6,  $F(M)$  es un  $s$ -grupo. Elijamos un  $s$ -subgrupo de Sylow de  $G$  conteniendo a  $F(M)$  y sea  $Z$  su centro. Entonces:  $Z \leq C_G(F(M)) \leq N_G(F(M)) = M$ , así que:  $Z \leq C_M(F(M)) \leq F(M)$ , por ser  $M$  resoluble. Sea:

$$L = \langle Z^y \mid y \in Y \rangle$$

entonces  $L \leq F(M)$  y por tanto  $L$  es un  $s$ -subgrupo normalizado por  $Y$ . Sea  $\mathcal{M}$  el conjunto de los  $s$ -subgrupos de  $G$  que satisfacen:

- i) son normalizados por  $Y$

ii) están generados por  $G$ -conjugados de  $Z$

Claramente  $1 \neq L \in \mathcal{M}$ . Sea  $K$  maximal de  $\mathcal{M}$  conteniendo a  $L$  y sea  $S$  un  $s$ -subgrupo de Sylow de  $G$  conteniendo a  $K$ . Como  $Y$  es un  $r$ -subgrupo localmente central es normal en el  $r$ -subgrupo de Sylow en cuyo centro está contenido. Así por 4  $G = \langle S, Y \rangle$ . Como  $Y \leq N_G(K)$  debe ser  $S \not\leq N_G(K)$ , es decir  $N_S(K) < S$  luego  $N_S(K) < N_S(N_S(K))$  y podemos considerar  $x \in N_S(N_S(K)) - N_S(K)$ . Por tanto  $K \neq K^x \leq N_S(K)$ . Como  $K^x$  está generado por conjugados de  $Z$ , sea  $Z^g$  uno de ellos tal que  $Z^g \not\leq K$ .

Recordar que  $Y$  es un  $r$ -subgrupo no trivial localmente central de  $G$  y  $Z$  es un  $s$ -subgrupo no trivial localmente central de  $G$ , luego  $G = C_G(Z)C_G(Y)$ . Sean  $u \in C_G(Z), v \in C_G(Y)$  tales que  $g = uv$ . Entonces  $Z^g = Z^{uv} = Z^v$ . Sea

$$L^* = \langle Z^{vy} | y \in Y \rangle = \langle Z^{yv} | y \in Y \rangle = L^v$$

Es claro que  $L^*$  es un  $s$ -subgrupo normalizado por  $Y$  y generado por ciertos conjugados de  $Z$ , por tanto  $L^* \in \mathcal{M}$ . Además como  $Y \leq N_G(K)$  y  $Z^v = Z^g \leq K^x \leq N_G(K)$  se tiene que  $L^* \leq N_G(K)$ , luego  $KL^*$  es un  $s$ -subgrupo de  $G$ ,  $KL^* \in \mathcal{M}$  y  $K < KL^*$  lo que está en contra de la maximalidad de  $K$ .

9. Un  $r$ -subgrupo localmente central  $Y \neq 1$  de  $G$  no normaliza a un  $s$ -subgrupo no trivial de  $G$ .

Supongamos que  $Y \leq N_G(S)$  siendo  $S$  un  $s$ -subgrupo no trivial de  $G$ . Entonces  $N_G(S)$  contiene a  $Y$ , que es un  $r$ -subgrupo localmente central no trivial y al centro de un  $s$ -subgrupo de Sylow que contiene a  $S$ , que es un  $s$ -subgrupo localmente central no trivial de  $G$ . Si  $N_G(S) \leq M < G$ , por 8 sabemos que  $F(M)$  es a la vez  $r$ -grupo y  $s$ -grupo, luego  $F(M) = 1$ , lo que no es posible pues  $M$  es resoluble (ver la nota que sigue al Teorema 5 de la Lección 2).

10.  $G$  tiene orden impar.

Recordar que como consecuencia del Teorema de Baer (Corolario 2 de la Lección 4) sabemos que si  $t$  es una involución de un grupo  $G$  y  $t \notin O_2(G)$ , existe un  $2'$ -elemento  $1 \neq h \in G$  tal que  $h^t = h^{-1}$ .

Suponer que  $2 \parallel |G|$ . Sea  $t$  una involución del centro de un 2-subgrupo de Sylow de  $G$ , como  $O_2(G) = 1$ , por el resultado anterior  $\langle t \rangle$  normaliza a un  $2'$ -subgrupo de  $G$  no trivial (es decir a un  $q$ -subgrupo no trivial de  $G$ ), lo que no es posible por 9.

11. Si  $E$  es un  $p$ -grupo,  $\Omega(E)$  denota el subgrupo de  $E$  generado por los elementos de orden  $p$ .

Sea  $R_0$  un  $r$ -subgrupo no trivial de  $G$  tal que  $C_G(R_0) \leq L < G$ . Además sea  $R_0 \leq R_1 \leq R_2$  con  $R_1 \in \text{Syl}_r(L)$  y  $R_2 \in \text{Syl}_r(G)$ . Entonces :

- a)  $F(L) = O_r(L)$
- b)  $\Omega(Z(R_2)) \leq \Omega(Z(O_r(L)))$
- c)  $C_G(\Omega(Z(O_r(L))))$  es un  $r$ -grupo

En efecto:

a) Como  $1 \neq Z(R_2) \leq C_G(R_0) \leq L$  y  $Z(R_2)$  es un  $r$ -subgrupo localmente central de  $G$ , por 9 se sigue que  $O_s(L) = 1$ . así  $F(L) = O_r(L)$ .

b) Como  $O_r(L) \leq R_1 \leq R_2$  se sigue que  $Z(R_2) \leq C_L(F(L)) \leq F(L)$  pues  $L$  es resoluble.

Por tanto  $Z(R_2) \leq Z(O_r(L))$  y de ahí que  $\Omega(Z(R_2)) \leq \Omega(Z(O_r(L)))$

c) Si  $S \in \text{Syl}_s(C_G(\Omega(Z(O_r(L)))))$ , por b) se tiene que  $[S, \Omega(Z(R_2))] = 1$  y como  $\Omega(Z(R_2))$  es un  $r$ -subgrupo localmente central de  $G$ , por 9 se sigue que  $S = 1$  y así  $C_G(\Omega(Z(O_r(L))))$  es un  $r$ -grupo.

12. Sea  $P_0$  un  $p$ -subgrupo de  $G$  no trivial, entonces  $N_G(P_0)$  tiene  $q$ -subgrupos de Sylow cíclicos.

En particular si  $F(M)$  es  $p$ -grupo, siendo  $M < G$ ,  $M = N_G(F(M))$  tiene  $q$ -subgrupos de Sylow cíclicos

Suponer que sucede lo contrario y sea  $V = \Omega(Z(P_0))$ . Por la consecuencia del Teorema 1 de la Lección 7, dichos  $q$ -subgrupos de Sylow contendrán un subgrupo del tipo  $C_q \times C_q$  y como  $N_G(P_0) \leq N_G(V)$ , este último contendrá un tal subgrupo.

Sea  $\mathcal{N}$  el conjunto de pares  $(A, V)$  que satisfacen:

- i)  $A \cong C_q \times C_q$
- ii)  $V$  es un subgrupo no trivial  $p$ -elemental abeliano  $A$ -invariante maximal de  $G$

Por lo anterior,  $\mathcal{N}$  no es vacío. Sea  $(A, V) \in \mathcal{N}$  con  $|C_V(A)|$ , lo mayor posible.

Podemos afirmar que :

$$C_V(A) < V$$

Para ello, consideremos  $Y = \Omega(Z(O_p(N_G(V))))$ . Apliquemos 11 con  $R_0 = V$  y

$L = N_G(V)$ , entonces  $C_G(Y)$  es  $p$ -grupo.  $Y$  es un  $A$ -invariante  $p$ -elemental abeliano subgrupo de  $Z(O_p(N_G(V)))$  y  $V \leq O_p(N_G(V))$ , así  $VY$  es un  $A$ -invariante  $p$ -elemental abeliano. Por lo tanto, por la elección de  $V$  es  $Y \leq V$  y se sigue que  $C_G(V) \leq C_G(Y)$ . Así  $C_G(V)$  es un  $p$ -grupo y si  $V = C_V(A)$ , se seguiría que  $A \leq C_G(V)$ , llegando a contradicción.

Por el Lema 3 de la Lección 7 se tiene que:

$$V = \langle C_V(x) \mid 1 \neq x \in A \rangle$$

y existirá  $1 \neq x \in A$  tal que  $C_V(A) < C_V(x) = U$ . Como  $A$  centraliza a  $x$ ,  $U$  es  $A$ -invariante y no centralizado por  $A$ . Así  $A$  induce sobre  $U/C_V(A)$  un  $q$ -grupo de automorfismos no trivial, ya que en otro caso:  $[U, A] \leq C_V(A)$  luego  $[U, A, A] = 1 = [U, A]$ , por el Corolario 4 de la Lección 6. Como  $|\text{Aut}C_p| = p - 1$  y  $p < q$ , se concluye:

$$|U/C_V(A)| \geq p^2$$

Sea  $Z_1 = \Omega(Z(O_q(C_G(x))))$ , entonces como  $\langle x \rangle \trianglelefteq C_G(x)$  es  $\langle x \rangle \leq O_q(C_G(x))$  y finalmente  $\langle x \rangle \leq Z(O_q(C_G(x)))$ , luego  $x \in Z_1$ . Por 11 c) con  $\langle x \rangle, C_G(x)$  y  $q$  en lugar de  $R_0, L$  y  $r$ , tenemos que  $C_G(Z_1)$  es  $q$ -grupo. Como  $1 \neq U \leq C_G(x)$  se tiene que  $Z_1$  es normalizado pero no centralizado por  $U$ , pues  $U$  es  $p$ -grupo. Así  $\langle x \rangle < Z_1$  y  $U$  induce sobre  $Z_1 / \langle x \rangle$  un grupo de automorfismos no trivial, pues en otro caso sería  $[U, Z_1] \leq \langle x \rangle$  luego:  $[Z_1, U, U] = 1 = [Z_1, U]$ , lo que no es posible.

Como  $U$  no puede ser cíclico, por el Lema 3 de la Lección 7 se tiene:

$$Z_1 / \langle x \rangle = \langle C_{Z_1 / \langle x \rangle}(W) \mid |U : W| = p \rangle$$

luego existe  $W \leq U$  tal que  $|U : W| = p$  que centraliza a un subgrupo  $1 \neq Z_2 / \langle x \rangle$  de  $Z_1 / \langle x \rangle$ , es decir  $[Z_2, W] \leq \langle x \rangle$  luego  $[Z_2, W, W] = 1 = [Z_2, W]$ . Como  $Z_1$  es elemental abeliano, existe  $A_1 \leq Z_2$ ,  $A_1 \cong C_q \times C_q$  y como  $A_1$  centraliza a  $W$ , podemos encontrar un  $A_1$ -invariante  $p$ -elemental abeliano maximal, sea  $V_1$ , conteniendo a  $W$ . Entonces  $(A_1, V_1) \in \mathcal{N}$  y  $W \leq C_{V_1}(A_1)$ . Ahora bien:

$$|W| = |U|/p > |C_V(A)|$$

lo que está en contradicción con la elección del par  $(A, V)$ .

13. Sea  $M < .G$  con  $F(M)$   $r$ -grupo. Entonces  $M/F(M)$  tiene  $r$ -subgrupos de Sylow cíclicos.

Considerar:

$$F(M/F(M)) = F(M/O_r(M)) = O_s(M/O_r(M)) = L/O_r(M)$$

así  $L = O_r(M)S$  con  $S \in \text{Syl}_s(L)$ .

Por el argumento de Frattini  $M = SO_r(M)N_M(S) = O_r(M)N_M(S)$ .

Si  $S = 1$  se tiene que  $M/F(M) = 1$  y 13 se cumple.

Si  $S \neq 1$ , tenemos dos posibilidades:

i)  $s = p$ . Entonces por 12  $N_G(S)$  tiene  $q$ -subgrupos de Sylow cíclicos, de ahí que  $M/F(M) = O_r(M)N_M(S)/O_r(M) \cong N_M(S)/N_{O_r(M)}(S)$  tiene  $q$ -subgrupos de Sylow cíclicos.

ii)  $s = q$ . Entonces  $r = p$  y como  $1 \neq F(M)$  es un  $p$ -subgrupo de  $G$  y  $M = N_G(F(M))$ , por 12 se sigue que  $M$  tiene  $q$ -subgrupos de Sylow cíclicos luego se sigue que  $S$  es cíclico y como  $2 < q$  es conocido que  $\text{Aut}(S)$  es también cíclico.

Considerar  $M^* = M/F(M)$ , entonces  $F(M^*) \cong S$ , luego  $C_{M^*}(F(M^*)) = F(M^*)$  y por tanto  $M^*/F(M^*)$  es isomorfo a un subgrupo de  $\text{Aut}(F(M^*))$ . Por lo tanto  $M^*/F(M^*)$  es cíclico y si  $P^* \in \text{Syl}_p(M^*) \implies P^* \cong P^*F(M^*)/F(M^*)$  es también cíclico.

14. Si  $R$  es un  $r$ -grupo, denotaremos por  $J_0(R)$  al subgrupo de  $R$  generado por todos sus subgrupos elementales abelianos de orden maximal. Claramente  $J_0(R)\text{car}R$  y si  $J_0(R) \leq U \leq R$  entonces  $J_0(R) = J_0(U)$ .

(El subgrupo de Thompson  $J(R)$  es similar, omitiendo la palabra "elemental" en la definición. Subgrupos de este tipo juegan un papel importante en la teoría de grupos no resolubles).

15. Sea  $M < .G$  con  $F(M)$   $r$ -grupo. Si  $R \in \text{Syl}_r(M)$ , entonces  $M = N_G(J_0(R))$  y  $R \in \text{Syl}_r(G)$ .

Sea  $K = F(M) = O_r(M)$ . Supongamos que  $J_0(R) \not\leq K$  y llegaremos a contradicción. Sea  $A$  un subgrupo elemental de orden maximal de  $R$  no contenido en  $K$ . Por 13  $AK/K$  es cíclico y así  $|A : A \cap K| = r$ .

Sea  $V = \Omega(Z(K))$ , observar que  $(A \cap K)V$  es subgrupo elemental abeliano de  $R$ . De ahí que:

$$|A| \geq |(A \cap K)V| = |A \cap K||V|/|A \cap V| = |A||V|/r|A \cap V|$$

Así  $|V : A \cap V| \leq r$ .

Como  $1 \neq V \text{car} K \trianglelefteq M$  y  $M < .G$  es  $M = N_G(V)$ . Como consecuencia  $C_G(V) \leq M$  y por 11, tomando  $V$  como  $R_0$  y  $M$  como  $L$ , tenemos que  $C_G(V)$  es un  $r$ -grupo, de hecho es  $r$ -subgrupo normal de  $M$  y así  $C_G(V) \leq K \leq C_G(V)$  y por tanto  $K = C_G(V)$ .

Sea  $H = M/K = M/C_M(V)$  grupo de automorfismos de  $V$ . además  $O_r(H) = O_r(M/O_r(M)) = 1$ . Sea  $a \in A - (A \cap K)$  y  $h = aK$ , entonces  $A \cap V \leq C_V(h)$  y como  $|V : A \cap V| \leq r$ , se sigue que  $|V : C_V(h)| \leq r$ . Por el Lema 5 de la Lección 7 se sigue que  $h = 1$ , luego  $a \in K$  lo que es una contradicción.

Por tanto  $J_0(R) \leq K \leq R$  y así  $J_0(R) = J_0(K) \text{car} K \trianglelefteq M$ , luego  $M = N_G(J_0(R))$ .

Si  $R < R^* \in \text{Syl}_r(G)$  sería  $J_0(R) \text{car} R < N_{R^*}(R)$ , pero esto no puede ser pues se tendría que:  $N_{R^*}(R) \leq N_G(J_0(R)) = M$  y  $R \in \text{Syl}_r(M)$ . Así  $R \in \text{Syl}_r(G)$ .

16. Sea  $M < .G$  con  $F(M)$   $r$ -grupo. Si  $g \in G - M$  entonces  $M \cap M^g$  es un  $s$ -grupo.

Notar que  $M \neq M^g$  pues  $N_G(M) = M$ .

Suponer que la afirmación no es cierta y elegir  $g \in G - M$  de forma que un  $r$ -subgrupo de Sylow  $R$  de  $M \cap M^g$  tenga el orden mayor posible. Si  $R \in \text{Syl}_r(M)$  se sigue que  $R \in \text{Syl}_r(M^g)$ . Así, por 15,  $M = N_G(J_0(R)) = M^g$ , que no es posible. Por lo tanto  $1 < R < R_1$  para algún  $R_1 \in \text{Syl}_r(M)$ , y de ahí que  $R < N_{R_1}(R)$ . Sea  $H < .G$  conteniendo a  $N_G(R)$ . Por 11 a)  $F(H)$  es  $r$ -grupo y por 15  $H = N_G(J_0(R_2))$ , para algún  $R_2 \in \text{Syl}_r(G)$ . También por 15 tenemos que  $R_1 \in \text{Syl}_r(G)$  y se sigue que  $J_0(R_2)$  es conjugado a  $J_0(R_1)$  en  $G$ . Como consecuencia  $H$  es conjugado con  $N_G(J_0(R_1)) = M$ .

Como  $R < N_{R_1}(R) \leq H \cap M$ , la elección de  $R$  y  $M^g$  fuerza a que  $H = M$ . Un argumento análogo aplicado a  $R$  como subgrupo de  $M^g$ , lleva a que  $H = M^g$  y así a la contradicción  $M = M^g$ .

17. Conclusión.

Sea  $r$  el primo para el que un  $r$ -subgrupo de Sylow de  $G$  tiene mayor orden que un  $s$ -subgrupo de Sylow de  $G$ . Sea  $C_G(Z(R)) \leq M < .G$ . Por 11 a)  $F(M)$  es un  $r$ -grupo. Si  $g \in G - M$ , por 16 tenemos que  $R \cap R^g = 1$ , así  $RR^g$  es un subconjunto de  $G$  conteniendo

$|R||R^g| = |R|^2$  elementos. Sin embargo  $|R|^2 > |R||S| = |G|$ , y así la contradicción final completa la demostración.

## Prácticas de Teoría de Grupos

### Práctica 1

1. Si  $[[a, b], a] = 1$ ,  $a, b \in G$ , probar que para cualquier  $n \geq 1$  se tiene:

$$[a^n, b] = [a, b]^n$$

2. Si  $[[a, b], a] = 1 = [[a, b], b]$ ,  $a, b \in G$ , probar que para cualquier  $n \geq 1$  se tiene

$$(ab)^n = a^n b^n [b, a]^{\binom{n}{2}},$$

3. Probar que si  $|G/Z(G)| = 4$ , entonces  $|G'| = 2$ .

4. Si  $x \in G$ ,  $G$  grupo finito, con  $o(x) = 2$  y los 2-subgrupos de Sylow de  $C_G(x)$  son ccllicos, probar que son 2-subgrupos de Sylow de  $G$ .

5. Demostrar que si en un grupo finito  $G$  existe  $x$  tal que  $|C_G(x)| = p$ , entonces cada  $p$ -subgrupo de Sylow de  $G$  tiene orden  $p$ .

6. Sea  $|G| = p^n$  y  $|G : C_G(x)| \leq p, \forall x \in G$ . Probar:

i)  $C_G(x) \trianglelefteq G, \forall x \in G$

ii)  $G' \leq Z(G)$

iii)  $|G'| \leq p$

7. Sea  $G$  finito,  $p$  el menor primo dividiendo a  $|G|$ ,  $p$  impar y  $G' \cong C_p \times C_p$ , entonces  $G$  es nilpotente.

8. Sea  $G$  finito,  $H \leq G$  tal que  $C_G(x) \leq H, \forall x \in H - \{1\}$ . Probar que:

$$(|H|, |G : H|) = 1$$

es decir que  $H$  es un subgrupo de Hall de  $G$ .

9. Sea  $G$  un grupo finito nilpotente y sea  $A$  maximal entre todos los subgrupos normales abelianos de  $G$ . Probar que  $A = C_G(A)$ .

10. Demostrar:

i) Si  $N \trianglelefteq G$ , entonces:  $\phi(N) \leq \phi(G)$ .

ii) Si  $N \trianglelefteq G$ ,  $N$  nilpotente y  $G/N'$  nilpotente, entonces  $G$  es nilpotente.

iii)  $F(G/Z(G)) = F(G)/Z(G)$ .

## Práctica 2

11. (M. Isaacs) Si  $G$  es un grupo finito, tal que todas las clases de conjugación fuera de  $Z(G)$  tienen cardinal  $p$  y  $G/Z(G)$  es abeliano, probar que  $|G'| = p$ . (Confrontar con los problemas 3 y 6 de la Práctica 1).

12. Si  $m \neq 1$  es un divisor de  $p - 1$ , siendo  $p$  primo, usar el producto semidirecto para construir un grupo de orden  $pm$ , no abeliano, que contiene un subgrupo normal de orden  $p$ .

13. Sea  $G$  un  $p$ -grupo finito. Probar que  $\phi(G)$  es el menor normal de  $G$  que da cociente  $p$ -elemental abeliano.

14. Considerar el producto semidirecto  $G = \langle \alpha \rangle \times_i \langle a \rangle$  con  $o(a) = 5$  y  $\alpha(a) = a^2$ . Comprobar que:

i)  $\phi(G) = 1$

ii)  $\phi(\langle \alpha \rangle) = \langle \alpha^2 \rangle \cong C_2$

iii)  $\phi(G) \langle a \rangle / \langle a \rangle \cong \phi(G / \langle a \rangle)$

15. Se considera el grupo cuaternio de orden ocho:  $Q_8$ , comprobar que la aplicación de dicho grupo en sí mismo  $\alpha$  tal que  $\alpha(i) = j$  y  $\alpha(j) = ij$  es un automorfismo. Si  $G = \langle \alpha \rangle \times_i Q_8$ , es el correspondiente producto semidirecto, se pide:

i) Obtener  $Z(G), G', F(G), \phi(G)$ .

ii) Describir los subgrupos nilpotentes de  $G$ .

16. Sea  $A = \langle a \rangle \cong C_8$  y  $\alpha \in \text{Aut}(A)$  dado por  $\alpha(a) = a^3$ , entonces  $o(\alpha) = 2$ . Sea  $G$  el holomorfo relativo correspondiente. Entonces  $G$  se llama semidiédrico de orden 16. Encontrar en  $G$  subgrupos  $H_1, H_2, H_3$  tales que  $H_1 \cong C_8, H_2 \cong D_8, H_3 \cong Q_8$ . Demostrar que la clase de nilpotencia de  $G$  es 3.

17. Se considera  $C_3 \times C_3$  como un  $\mathbf{Z}/3\mathbf{Z}$ -espacio vectorial de dimensión 2. Sea

$$A = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \leq \text{GL}(2, 3)$$

En una base previamente fijada, cada una de dichas matrices representa un automorfismo. Considerar el holomorfo relativo correspondiente  $G$ . Hallar  $F(G), \phi(G), G'$ .

18. Sea  $G = NH$  con  $N \trianglelefteq G$ ,  $N$  abeliano y  $N \cap H = 1$ . Probar que

$$C_G(N) = N \times \text{core}_G(H)$$

19. Sea  $K$  un grupo abeliano y  $G = \text{Hol}(K)$ . Probar que

$$C_G(K) = K$$

.

20. Sea  $K$  un grupo abeliano,  $H \leq \text{Aut}(K)$ , y  $G = [K]H$  el holomorfo relativo asociado. Probar que:

$$Z(G) = C_K(H)$$

### Práctica 3

21. Es conocido que un grupo  $G$  tal que  $x^2 = 1$ , cualquiera que sea  $x \in G$ , es abeliano. Se trata ahora de encontrar ejemplos de grupos no abelianos verificando  $x^p = 1$  para cualquier  $x \in G$ ,  $p$  primo ( $p > 2$ ). Considerar  $C_3 \times C_3$  como  $\mathbf{Z}/3\mathbf{Z}$ -espacio vectorial. Sea  $\alpha$  el automorfismo que en una base de  $C_3 \times C_3$  tiene a la matriz  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  como matriz coordenada. Considerar el holomorfo relativo:  $G = \langle \alpha \rangle \times_i (C_3 \times C_3)$ . Probar que  $x^3 = 1 \forall x \in G$ , pero que  $G$  no es abeliano. Hallar  $Z(G), \phi(G), G'$ . (Este grupo es un ejemplo de grupo extraespecial).

22. Sea  $K = C_p, H = \text{Aut}(K)$  y  $G = \text{Hol}(K)$ , donde  $p$  es un primo. Se pide razonar que:

- i)  $H < .G$  y  $\text{core}_G(H) = 1$
- ii)  $F(G) = K$  y  $\phi(G) = 1$
- iii) Para  $p = 5$   $\phi(G/K)$  no es trivial.

23. Sea  $\alpha \in \text{Aut}(\Sigma_3)$  dado por :

$$\alpha((1, 2, 3)) = (1, 2, 3), \alpha((1, 2)) = (2, 3)$$

Comprobar que  $o(\alpha) = 3$  y considerar el holomorfo relativo  $G = \langle \alpha \rangle \times_i \Sigma_3$ . Obtener  $G', F(G), \phi(G), Z(G)$ .

24. Sea  $K = \langle a \rangle \cong C_{13}$  y  $H = \langle \alpha \rangle \leq \text{Aut}(K)$  dado por  $\alpha(a) = a^{10}$ . Comprobar que  $o(\alpha) = 6$  y obtener  $G', \phi(G), F(G)$  y  $Z(G)$ .

25. Considerar a  $C_3 \times C_3$  como  $\mathbf{Z}/3\mathbf{Z}$ -espacio vectorial. Sea  $\alpha$  el automorfismo que en una base de  $C_3 \times C_3$  tiene a la matriz  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ . Considerar el holomorfo relativo  $G = \langle \alpha \rangle \times_i (C_3 \times C_3)$  y hallar  $G', F(G), \phi(G)$  y  $Z(G)$ .

## Práctica 4

26. Si  $G$  es un grupo finito demostrar que:  $\pi(G/\phi(G)) = \pi(G)$

27. Sea  $G$  finito,  $A \trianglelefteq G$ ,  $A$  abeliano tal que  $A \cap \phi(G) = 1$ . Probar que  $A$  tiene complemento en  $G$ .

(Ayuda: Considerar  $\{S \mid S \leq G, G = AS\}$ . Sea  $L$  minimal en dicho conjunto. Probar que  $A \cap L \trianglelefteq G$ ,  $A \cap L \leq \phi(L)$ ,  $A \cap L \leq \phi(G)$ , obteniendo finalmente que  $L$  es complemento de  $A$  en  $G$ .)

28. Demostrar que si  $G$  es finito y  $N \trianglelefteq G$ ,  $N$  abeliano y  $H$  un complemento de  $N$  en  $G$ , entonces  $H < G$ .

29. Sea  $N \trianglelefteq G$ ,  $N$  abeliano, entonces  $N$  tiene complemento en  $G$  si y solo si  $N \not\leq \phi(G)$ .

30. i) Sea  $F$  un cuerpo. Considerar la acción de  $F^*$  sobre  $F^+$  vía multiplicación. Razonar que dicha acción es irreducible, es decir que los únicos subgrupos que quedan invariantes por dicha acción son  $\{0\}$  y el propio  $F^+$ .

ii) Razonar que para cada primo  $p$  y cualquier entero  $n$ ,  $n \geq 1$ , existe un grupo resoluble finito con un maximal de índice  $p^n$ .

31. Sea  $H(k) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b, c \in k \right\} \leq \text{GL}(3, k)$

Comprobar:

i)  $Z(H(k)) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid b \in k \right\}$ .

ii)  $H(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}) \cong D_8$ .

iii) En general  $H(k)$  es nilpotente de clase 2.

Este grupo es conocido como grupo de Heisenberg y si  $k = \mathbf{R}$  juega un importante papel en mecánica cuántica.

32. El grupo de Pauli. Sea  $P = \langle a = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \rangle \leq \text{GL}(2, \mathbf{C})$ . Observar que  $o(a) = 4$ ,  $o(b) = o(c) = 2$ ,  $a^b = a = a^c$ ,  $b^c = ba^2$ . Comprobar que  $|P| = 16$ . Hallar  $Z(P)$ ,  $P'$ ,  $\phi(P)$ .

### Cuestiones sobre Teoría de Sylow

1. Si  $P \in \text{Syl}_p(G)$  y  $N \trianglelefteq G$ , entonces  $PN/N \in \text{Syl}_p(G/N)$ .

2. Si  $P \in \text{Syl}_p(G)$  y  $N \trianglelefteq G$ , entonces  $P \cap N \in \text{Syl}_p(N)$ .
3. Si  $G/N$  es un  $p$ -grupo y  $P \in \text{Syl}_p(G)$  se tiene que  $G = PN$ .
4. Si  $P \in \text{Syl}_p(G)$  y  $M, N \trianglelefteq G$ , entonces  $P \cap MN = (P \cap M)(P \cap N)$ .
5. Si  $G/N$  y  $G/M$  son  $p$ -grupos entonces  $G/N \cap M$  es también un  $p$ -grupo.
6. Si  $P \in \text{Syl}_p(G)$  y  $M, N \trianglelefteq G$ , entonces  $PN \cap PM = P(N \cap M)$ .
7. Argumento de Frattini. Si  $P \in \text{Syl}_p(N)$ ,  $N \trianglelefteq G$ , entonces  $G = NN_G(P)$ .
8.  $N_{G/N}(PN/N) = N_G(P)N/N$  siendo  $P \in \text{Syl}_p(G)$  y  $N \trianglelefteq G$ .
9.  $\bigcap P^g$ , cuando  $g$  recorre los elementos de  $G$ , es el mayor  $p$ -subgrupo normal de  $G$ .

Se denota  $O_p(G)$ .

10. Si  $N_G(P) \leq A \leq G$ , con  $P \in \text{Syl}_p(G)$ , entonces  $A = N_G(A)$ . En particular:  
 $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$ .

11. Sea  $P$  un  $p$ -subgrupo de  $G$ , entonces :  $P \in \text{Syl}_p(G) \Leftrightarrow P \in \text{Syl}_p(N_G(P))$ .

12. Si  $\nu_p(G) > 1$  y  $P_1, P_2 \in \text{Syl}_p(G)$  se eligen de forma que  $P_1 \neq P_2$  y  $|P_1 \cap P_2|$  sea el mayor posible, entonces  $\nu_p(N_G(P_1 \cap P_2)) > 1$ .

13. Todo grupo de orden  $p^a q$ , con  $p, q$  primos, es resoluble.

14. Todo grupo de orden  $pqr$ , con  $p, q, r$  primos, es resoluble.

15. Todo grupo de orden  $p^2 q^2$ , con  $p, q$  primos, es resoluble.

16. Si  $|G| = p(p+1)$ , con  $p$  primo, entonces  $G$  tiene un subgrupo normal de orden  $p$  o un subgrupo normal de orden  $p+1$ .

17. Si  $|G| = pn$  con  $p$  primo tal que  $p > n$  y  $H \leq G$  con  $|H| = p$ , entonces  $H \trianglelefteq G$ .

## **BIBLIOGRAFIA.**

1. Doerk-Hawkes. Finite Soluble Groups. Walter de Gruyter, 1992.
2. Gorenstein. Finite Groups. Harper Row, 1968
3. Isaacs. Algebra. A graduate course. Brooks/Cole Pub. Comp. 1994
4. Isaacs. Finite Group Theory. Graduate Studies in Mathematics v.92 A.M.S., 2008.
5. Kurzweil-Stellmacher. The Theory of Finite Groups. Springer, 2004
6. Rose. A course on group theory. Cambridge Univ. Press, 1978.