GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

AEMet
Agencia Estatal de Meteorología
Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana

RESUMEN CLIMATOLÓGICO DEL AÑO 2017 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (AVANCE)

Imágenes meteorológicas del año 2017 en la Comunidad Valenciana. ARRIBA, imagen del claustro del convento de los Franciscanos de Benissa cubierto por la nieve que cayó el día 18 de enero. Imagen del observador José Llorca. La fotografía iba acompañada del siguiente comentario: "un regalo del Dueño de las Nubes o de la Hermana Madre Tierra que dice San Francisco". ABAJO, imagen aérea de Morella tras la nevada de enero de 2017, autor Xavi Salvia, enviada por Miguel Agost vía twitter @miguelagost

CORREO ELECTRONICO:
jnunezm@aemet.es

C/Botánico Cavanilles nº3
46071 – Valencia
Tfno: 963-690-836
Fax: 963-694-976

© AEMET. **Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.**

AVANCE CLIMATOLÓGICO DEL AÑO 2017
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

TEMPERATURA

Con datos provisionales hasta el 20 de diciembre, el año **2017** tendrá con una probabilidad alta una temperatura media estimada de 16.0ºC en el promedio del territorio de la Comunidad Valenciana, que es **0.7ºC más** que el promedio normal (15.3ºC) y, en comparación con la serie de temperatura media del periodo de 30 años 1981-2010, lo califican como un año **extremadamente cálido.**

El año actual será probablemente, junto con 2016 **el tercero más cálido** en la Comunidad Valenciana **desde al menos 1941,** sólo superado por 2014 y 2015. Es decir, se han registrado de forma consecutiva los cuatro años más cálidos en la Comunidad Valenciana, superando a 2006, que es el quinto año más cálido de la serie. 7 de los 8 años más cálidos desde 1941 en la Comunidad Valenciana se han registrado a partir de 2006. Por este orden, y de más a menos cálido, los ocho años de temperatura media más alta han sido: 2014, 2015, 2016, 2017, 2006, 1994, 2011 y 2009.



Aunque enero y diciembre, el primer y último mes de 2017, han resultado fríos (las primeras estimaciones indican que diciembre de 2017 será un mes muy frío, con una anomalía inferior a -1ºC), el carácter cálido o muy cálido de los meses de febrero a julio, y el carácter muy cálido del mes de octubre, han determinado finalmente que 2017 vaya a terminar entre los 4 años más cálidos de la serie.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*



La siguiente tabla contiene la temperatura media mes a mes en este año 2017, la temperatura normal y la anomalía. Para los datos de diciembre se han estimado las temperaturas de la última decena del mes.

Mes	Temperatura 2017	Temperatura normal	Anomalía
enero	7.1ºC	7.8ºC	**-0.7ºC**
febrero	10.2ºC	8.8ºC	**+1.4ºC**
marzo	12.4ºC	11.2ºC	**+1.2ºC**
abril	13.6ºC	13.0ºC	**+0.6ºC**
mayo	18.1ºC	16.5ºC	**+1.6ºC**
junio	23.2ºC	20.9ºC	**+2.3ºC**
julio	24.6ºC	24.0ºC	**+0.6ºC**
agosto	24.4ºC	24.1ºC	**+0.3ºC**
septiembre	20.4ºC	9.0ºC	**-0.3ºC**
octubre	18.1ºC	16.3ºC	**+1.8ºC**
noviembre	11.6ºC	11.6ºC	**+0.0ºC**
diciembre	7.6ºC	8.7ºC	**-1.1ºC**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*

Lo más destacado del año 2017 en cuanto a temperatura fue el extraordinario episodio de calor de los días **9 y 10 de marzo**, cuando se superaron los 32ºC en observatorios de Alicante y del sur de Valencia, no habiendo precedentes de un día tan cálido en fecha tan temprana del año en la Comunidad Valenciana. El día 10 de marzo se superó el récord de temperatura máxima absoluta en el mes de marzo en observatorios del sur de Alicante con series de datos superiores a 40 años como Orihuela, Rojales o el Aeropuerto de Alicante-Elche.

Junio fue un mes de temperatura persistentemente altas, sobre todo en el interior, pero lo más significativo de junio ocurrió los últimos días del mes, ya que a partir del día 27, el viento que estuvo en calma y con régimen de brisas, giró a poniente, y el calor se trasladó a la costa durante un par de días, mientras que las temperaturas descendían en el interior. En esos días de final de junio se registró el único episodio adverso de viento de poniente en la Comunidad Valenciana en el año 2017. Durante los días **27 y 28 de junio** hubo viento de poniente persistente, con rachas de entre 60 y 70 km/h, con humedad muy baja, inferior al 20% y temperaturas superiores a 35ºC, alcanzando los 40ºC en Barxeta, 39.5ºC en Xàtiva y 38.4ºC en el aeropuerto de Valencia, que es la temperatura más alta registrada en un mes de junio en este observatorio que comenzó a registrar datos en 1966. Estas adversas condiciones meteorológicas favorecieron la propagación del incendio de Gátova que se declaró el día 28 y se extendió hasta el sur de la provincia de Castellón los días siguientes.



Las temperaturas más altas del año se registraron los días **12 y 13 de julio**, con valores que superaron los 42ºC en el interior de Valencia y Alicante: Fontanars, 43.0ºC; Jalance, 42.8ºC; Alcoi, 42.2ºC; Beneixama y Utiel, 42.0ºC.

© AEMET. **Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.**

En cuanto al frío, destacó la ola de frío de los días **18 y 19 de enero** generada por la entrada de una masa de aire polar continental, a la que sucedió la entrada de otra masa de aire muy húmedo con largo recorrido por el Mediterráneo que dio lugar a precipitaciones generalizadas a partir del día de 19 y hasta el día 23, con nevadas que podrían calificarse como históricas en amplias zonas del interior de las 3 provincias y que incluso llegaron hasta el nivel del mar en la provincia de Alicante. Las temperatura más bajas de 2017 se registraron durante la ola de frío del mes de enero. En el promedio del territorio, el día 18 de enero fue el más frío desde enero de 2005, y ese día la mínima llegó a -10.2ºC en la Puebla de San Miguel, -10.1ºC en Vilafranca y -9.7ºC en Ademuz.

Las **3 primeras semanas del mes de diciembre** también se han caracterizado por temperaturas frías, de hecho, diciembre de 2017 será probablemente el mes más anormalmente frío del año. Las temperaturas más bajas se registraron los primeros días del mes a causa de la entrada de una masa de aire de origen ártico, que canalizó una masa de aire muy frío que invadió todo el territorio. La posterior estabilidad atmosférica, la larga duración de las noches y el aire frío represado junto al suelo favorecieron que se registraran temperaturas muy bajas para fechas tan tempranas del invierno, con hasta -9.3ºC en Villena el día 5 de diciembre, -7.8ºC en Pinoso y -7.6ºC en Vilafranca.



Imagen del termómetro de temperatura mínima junto al suelo de la estación de Chiva (La Pailla) tomada el pasado 18 de diciembre. La temperatura mínima junto al suelo de ese día en Chiva fue de -7.7ºC. La imagen que muestra el termómetro cubierto de hielo, da idea del ambiente frío que ha predominado en el mes de diciembre, sobre todo de madrugada. Imagen del observador Víctor Marzo.

© AEMET. ***Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.***

PRECIPITACIÓN

La precipitación acumulada en 2017 (hasta el día 20 de diciembre) ha sido 367.7 l/m^2, que es un 28% inferior que la del promedio climático del periodo 1981-2010 (508.7 l/m^2) y califican al año 2017 como **SECO**. El año va a terminar probablemente con un carácter pluviométrico seco a pesar que durante el 75% del periodo presentó superávit pluviométrico debido a las abundantes lluvias del invierno 2016-2017, que resultó extremadamente húmedo, el más húmedo desde que hay registros, pero un otoño muy seco, el segundo más seco desde al menos 1941, ha dado lugar a que 2017 finalice con déficit pluviométrico en más del 90% del territorio.



Los datos de precipitación diaria en el promedio del territorio, muestran claramente el gran impacto que tuvo el temporal de levante del mes de enero en el balance anual. Un tercio del total de la precipitación acumulada en 2017 se registró entre los **días 18 al 22 de enero**, y hay zonas del litoral de Castellón y de la montaña del norte de Alicante en las que más de la mitad de todo lo acumulado en 2017 lo fue en el temporal de enero. Por ejemplo, en el observatorio de Castellón, en el temporal de levante del mes de enero se acumularon 191.2 l/m^2 y el resto del año, hasta el 20 de diciembre, 138.2 l/m^2, es decir, casi el 60% de toda la lluvia registrada en 2017 en el observatorio de Castellón lo fue en unos pocos días de enero. En Callosa d'en Sarrià, durante el temporal de levante del mes de enero se acumularon 403.7 l/m^2 y el resto del año, hasta el 20 de diciembre, 255.6 l/m^2, es decir, el 61% de toda la lluvia registrada en 2017 en Callosa d'en Sarrià lo fue en unos pocos días de enero.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*



Pero el temporal de levante de enero no sólo llevó aparejado lluvia, sino frío, viento, nieve, y oleaje, por lo que merece la pena recordar lo más significativo de este temporal invernal, con los fenómenos más significativos de cada día. El temporal se gestó por la presencia de un anticiclón sobre Europa a mitad de enero de 2017, que junto con bajas presiones en el Mediterráneo, provocó una entrada de aire frío de origen polar sobre la Comunidad Valenciana. Ya se ha comentado que el día **18 de enero** fue el más frío desde 2005. Además, la existencia en capas altas de un embolsamiento de aire frío, dio lugar a una gran inestabilidad atmosférica que, junto con la entrada de aire húmedo de componente este a partir del día 19, generaron precipitaciones que afectaron a prácticamente toda la Comunidad Valenciana, en numerosas zonas en forma de nieve. También fue significativo el viento, que dio lugar a un temporal marítimo, especialmente fuerte los días 21 y 22.

Las nevadas de este temporal empezaron en la tarde del martes **17 de enero**, y en general fueron poco importantes y afectaron sobre todo a zonas altas de Alicante, pero desde la madrugada del miércoles **18 de enero** y hasta el mediodía, se produjeron nevadas significativas, con espesores de alrededor 10 cm, en la Marina Alta (Alicante), llegando hasta el nivel del mar (ver imagen de portada). Desde febrero de 1983 no había habido un episodio similar de nevadas en esta comarca. También nevó en el litoral del sur de Alicante, en la Vega Baja (El Baix Segura), cuajando en zonas como la playa de Torrevieja donde no ocurría desde diciembre de 1926. En la montaña del norte de Alicante (El Comtat, L'Alcoià, zonas altas de ambas Marinas) empezaron las nevadas sobre todo durante la tarde del día 18, prolongándose todo ese día y también el 19.

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*

La mayor intensidad del episodio de nieve se registró el día **19 de enero**. Las nevadas, algunas de ellas acompañadas de tormenta, afectaron inicialmente a las comarcas del interior de Alicante y mitad sur de Valencia, con cotas alrededor de 300 m, extendiéndose a lo largo de la mañana hacia el resto del interior de la provincia de Valencia y por la tarde al interior de Castellón, con cotas alrededor de 500 m. Los acumulados registrados en esta primera parte del episodio fueron importantes, superando los 30 cm de forma generalizada. El día **20 de enero** las nevadas fueron progresando hacia el norte, siendo especialmente adversas en el interior de Castellón, y cesando en las zonas más afectadas de Valencia y Alicante debido a la subida de la cota de nieve. En Castellón se llegaron a registrar espesores de la capa de nieve muy altos, destacando Vilafranca con 74 cm. En Morella, la precipitación acumulada en forma de nieve (100 l/m^2) es, junto con los acumulados en la nevada de 1964, la más alta registrada en los 100 años de funcionamiento del observatorio, y el espesor de la capa de nieve superó el medio metro (ver imagen de portada).

La situación más significativa de lluvias se dio en la segunda parte del episodio, a partir del día **21 de enero**, afectando sobre todo al sur de Valencia y norte de Alicante, donde hubo observatorios que superaron los 300 l/m^2 en localidades de la montaña del norte de Alicante, entre la zona fronteriza de las comarcas de La Marina Alta, La Marina Baixa y El Comtat, habiendo registros superiores a los 200 l/m^2 en observatorios de las tres provincias.

El fuerte viento, con rachas que superaron los 100 km/h en la zona costera de La Marina Alta, generó un importante temporal marítimo, con mar arbolada y olas de más de 6 metros. La boya de Valencia de Puertos del Estado, registró una altura significativa de ola durante el temporal de 6,45 metros, superando su anterior récord de 5,63 metros registrado en diciembre de 2009.

El otro temporal de levante de 2017 también se produjo en el primer tercio del año, entre los días **12 y 13 de marzo**. Las lluvias del día 13 de marzo en la ciudad de Alicante tuvieron intensidad muy fuerte y acumularon 136.6 l/m^2. Con diferencia, el día 13 de marzo de 2017 es el más húmedo de la serie histórica de Alicante en un mes de marzo y, computando todos los meses del año, es el tercer día con más precipitación acumulada en 24 horas en los observatorios de la ciudad desde al menos 1934.

También en Alicante se produjo un inusual episodio de lluvias el **29 de agosto**. Ese día hubo lluvias generalizadas en toda la Comunidad Valenciana asociadas a tormentas. De ese día 29 destacan sobre todo los 48.9 l/m^2 acumulados en el observatorio de Alicante. Alicante tiene observaciones meteorológicas realizadas en distintos puntos de la ciudad desde mitad del siglo XIX, y en ese más de siglo y medio de datos, sólo en una ocasión se ha registrado más lluvia en 24 horas en un mes de agosto que los 48.9 l/m^2 del pasado día 29 de agosto, y fue hace más de 70 años, el 8 de agosto de 1945, cuando se registraron 82.4 l/m^2. En el aeropuerto de Alicante/Elche se registraron el día 29 de agosto 42.6 l/m^2, que es la mayor cantidad de precipitación acumulada en un mes de agosto en este observatorio desde que comenzaron a registrarse datos en 1967.

También, en la mañana de ese **29 de agosto**, una tromba marina que se formó frente a la costa de Burriana penetró en tierra en forma de tornado, afectando a una estrecha franja del puerto de Burriana con un recorrido en tierra de unos 500 metros y menos de 50 metros de ancho.

© AEMET. ***Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.***

Del otoño sólo destacar las tormentas del día **15 de septiembre**, que también afectaron a la ciudad de Alicante y que llegaron a tener intensidad muy fuerte, y fueron acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento en distintos puntos de comarcas centrales de la provincia.

La siguiente tabla contiene la precipitación acumulada mes a mes en este año 2017, la precipitación normal, y la anomalía. Para el mes de diciembre se han considerado datos hasta el día 20.Los meses de enero, marzo y agosto presentaron superávit pluviométrico, el resto de meses presentaron déficit. Especialmente significativo es que el déficit se ha ido incrementando a partir del mes de septiembre, de forma que cada mes, ha presentado un porcentaje de precipitación acumulada inferior al anterior.

Mes	Precipitación 2017	Precipitación Normal	Anomalía
enero	127.1	42.5	**+199%**
febrero	16.8	38.2	**-56%**
marzo	80.4	34.8	**+131%**
abril	22.2	48.7	**-54%**
mayo	11.1	47.3	**-77%**
junio	23.7	25.1	**-6%**
julio	7.7	11.3	**-32%**
agosto	40.1	20.1	**+100%**
septiembre	13.7	61.3	**-78%**
octubre	11.8	71.0	**-83%**
noviembre	8.7	58.4	**-85%**
diciembre*	4.5	49.9	**-91%**

**Los datos de diciembre están computados hasta el día 20*

En **valores absolutos**, el mapa de la página siguiente representa los acumulados del año 2017 en la Comunidad Valenciana. Desde los más de 600 l/m^2 de acumulado en localidades del norte de Alicante, a menos de 200 l/m^2 en la zona de Callosa de Segura, en la Vega Baja (El Baix Segura); en otras zonas repartidas por las 3 provincias el acumulado de 2017 es inferior a 300 l/m^2.

© AEMET. ***Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.***



AEMet

Agencia Estatal de Meteorología

Precipitación acumulada
AÑO 2017
(1 de enero a 20 de diciembre)
(l/m^2)

	< 100.0
	100.1 - 200.0
	200.1 - 300.0
	300.1 - 400.0
	400.1 - 500.0
	500.1 - 600.0
	600.1 - 800.0
	800.1 - 1 000.0
	1 000.1 - 1 200.0
	1 200.1 - 1 400.0
	1 400.1 - 1 600.0
	>1 600.0

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. ***Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.***

El balance pluviométrico del año 2017 (hasta el 20 de diciembre) en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el que se adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados en l/m^2 y están ordenados de mayor a menor acumulado en el año. Se han coloreado las celdas que expresan la anomalía de precipitación anual, en colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) los observatorios con déficit de precipitación, en verde, los observatorios con superávit.

Observatorio	2017	Promedio normal	Anomalía
Fontilles	840.6	899.1	-7%
Pego	733.6	832.3	-12%
Bolulla	695.6	638.7	+9%
Callosa d'en Sarrià	659.3	528.0	+25%
Jávea/Xàbia	647.4	656.6	-1%
Gata de Gorgos	647.3	751.2	-14%
Carrícola	625.2	739.6	-15%
Dénia	618.6	755.3	-18%
Oliva	524.2	727.1	-28%
Bocairent	486.6	655.6	-26%
Otos	479.1	676.7	-29%
Montanejos	466.2	538.6	-13%
Tavernes de la Valldigna	441.4	833.6	-47%
La Pobla de Benifassa	440.1	768.3	-43%
Zucaina	417.6	532.0	-22%
Antella	408.8	568.3	-28%
Morella	407.4	603.3	-32%
Alginet	402.0	565.7	-29%
Atzeneta del Maestrat	396.0	610.2	-35%
Sueca	391.9	635.4	-38%
Serra	391.0	533.3	-27%
Olocau	389.2	468.6	-17%
Cullera	383.2	599.7	-36%
Vilafranca	382.2	671.6	-43%
Elda	380.9	266.5	+43%
Ontinyent	378.2	594.6	-36%
Burriana	372.6	493.1	-24%
Torreblanca	367.5	491.2	-25%
Alicante/Alacant	361.0	311.1	+16%
La Romana	358.4	318.6	+12%
Alberic	354.4	564.1	-37%
Vila-real	352.0	505.8	-30%

Observatorio	2017	Promedio normal	Anomalía
Aras de los Olmos	351.7	477.4	-26%
Caudete de las Fuentes	350.4	413.1	-15%
Chiva	350.0	538.4	-35%
Silla	345.0	491.6	-30%
L'Alcora	340.9	483.0	-29%
Albal	340.8	476.9	-29%
València	335.6	474.9	-29%
La Font de la Figuera	333.7	424.3	-21%
Castelló	329.4	467.3	-30%
Requena	324.8	422.4	-23%
Aeropuerto de Valencia	322.9	457.7	-29%
Almenara	321.6	429.8	-25%
Massalfassar	319.0	427.6	-25%
Ademuz	312.3	410.4	-24%
Segorbe	308.1	495.7	-38%
Aeropuerto Alicante-Elche	305.8	276.4	+11%
Sant Mateu	305.3	680.7	-55%
Villena	303.0	301.8	0%
Pinoso/El Pinós	297.6	303.5	-2%
Sagunt	296.4	470.6	-37%
Villar del Arzobispo	292.2	436.5	-33%
Gilet	291.6	524.9	-44%
Utiel	291.5	392.5	-26%
Viver	281.3	485.6	-42%
Llíria	274.6	377.4	-27%
Novelda	272.4	287.7	-5%
Elche/Elx	269.0	263.3	+2%
Orihuela	253.7	284.4	-11%
Torrevieja	230.3	281.6	-18%
Crevillent	219.4	267.6	-18%
Benicarló	207.3	538.5	-62%
Callosa de Segura	174.6	296.3	-41%

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*

Salvo una pequeña franja de territorio entre las comarcas alicantinas del Vinalopó Mitjà (El Vinalopó Medio), L'Alacantí y la Marina Baixa, que presentan superávit pluviométrico, en el resto del territorio el acumulado de 2017 es inferior al promedio normal anual. El mayor déficit se observa en localidades del Baix Maestrat, donde el acumulado de 2017 (hasta el día 20 de diciembre) es inferior a la mitad de lo normal.



Como complemento a este resumen, en la página siguiente se adjunta una tabla con la estadística de precipitación en el promedio de cada comarca, el acumulado medio desde el 1 de enero y hasta el 20 de diciembre, la que sería la cantidad normal y la anomalía (% de déficit), ordenados de mayor a menor déficit.

© AEMET. ***Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.***

AEMet

ESTADÍSTICA COMARCAL
Precipitación acumulada, precipitación normal y anomalía
Año 2017

COMARCA	Precipitación acumulada (hasta el 20 de diciembre)	Normal (1981-2010)	Anomalía (% de déficit o superávit)
El Baix Maestrat	320.2	633.3	-49%
L'Alt Maestrat	355.5	649.1	-45%
La Ribera Baixa	371.2	627.2	-41%
Els Ports	363.5	613.6	-41%
La Plana Alta	340.9	535.4	-36%
La Ribera Alta	377.1	577.9	-35%
L'Horta Sud	336.5	514.2	-35%
L'Alcalatén	376.9	573.1	-34%
Valencia (València)	325.2	494.0	-34%
El Camp de Morvedre	322.4	485.7	-34%
La Serranía (Els Serrans)	320.6	479.0	-33%
El Rincón de Ademuz (El Racó d'Ademús)	317.0	468.3	-32%
La Costera	371.5	548.5	-32%
La Safor	534.0	760.1	-30%
La Hoya de Buñol (La Foia de Bunyol)	381.5	541.4	-30%
El Alto Palancia (L'Alt Palància)	371.2	520.7	-29%
L'Horta Oest	331.4	463.7	-29%
La Vall d'Albaida	443.5	609.7	-27%
La Plana Baixa	385.1	516.5	-25%
La Plana de Utiel-Requena	333.0	446.4	-25%
L'Horta Nord	324.8	434.0	-25%
La Vega Baja (El Baix Segura)	221.8	296.2	-25%
El Camp de Turia	329.1	438.8	-25%
El Alto Mijares (L'Alt Millars)	414.0	551.1	-25%
La Canal de Navarrés	412.5	544.8	-24%
El Valle de Cofrentes-Ayora (La Vall de Cofrents-Aiora)	352.7	451.0	-22%
El Comtat	555.6	675.2	-18%
La Marina Alta	663.8	765.7	-13%
L'Alcoià	372.6	424.4	-12%
L'Alt Vinalopó	303.9	340.9	-11%
El Baix Vinalopó	259.6	277.6	-7%
El Vinalopó Mitjà (El Vinalopó Medio)	312.3	295.8	+6%
La Marina Baixa	505.2	478.4	+6%
L'Alacantí	360.1	317.4	+13%

****Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales, actualizados hasta el 17 de diciembre y están sujetos a una posterior validación.***

Valencia a 20 de diciembre de 2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. ***Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.***