

TASAS DE VARIACIÓN E INDICADORES (NÚMEROS ÍNDICES)

NÚMEROS ÍNDICES , PERÍODO BASE , PERÍODO ACTUAL
CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS ÍNDICES
NÚMEROS ÍNDICES DE PRECIOS
NO PONDERADOS
 ÍNDICE DE SAUERBECK
 ÍNDICE DE BRADSTREET-DUTOT
PONDERADOS
 ÍNDICE DE LASPEYRES
 ÍNDICE DE PASCHE
 ÍNDICE DE FISHER
 ÍNDICE DE EDGEWORTH
EJEMPLO NÚMEROS INDICES DE PRECIOS PONDERADOS
PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS ÍNDICES
CUMPLIMIENTO DE PROPIEDADES
DEFLACTACIÓN DE SERIES ESTADÍSTICAS
CAMBIO DE BASE Y EMPALME

Número índice : Aquella medida estadística que sirve para comparar una magnitud (o un conjunto de magnitudes) en dos situaciones (temporales o espaciales) distintas; una de las cuales se considera como referencia. (Normalmente se tratará de comparar períodos de tiempo distintos)

Período base o referencia: Será la situación inicial o el periodo tomado como referencia.(subíndice 0)

Período actual: la situación que quiere compararse.(subíndice t)

Clasificación: Los números índices pueden ser:

SIMPLES: pretenden hacer comparaciones sobre una sola magnitud simple.(p.ej. el precio del trigo). Habitualmente se definen como ratios (razón) entre el valor actual y el valor del período base.

para la magnitud simple X_i

$$I_i^t = \frac{X_{it}}{X_{i0}}$$

COMPLEJOS: pretenden hacer comparaciones sobre una magnitud compleja, consistente en la agregación de varias magnitudes simples.(p.ej. precio de los cereales, cotización bursátil de un grupo (químicas,p.ej.).Habitualmente se utilizan promedios de índices simples (media aritmética, geométrica, armónica o agregativa).

Complejos **SIN PONDERAR:** Se utiliza un promedio de índices simples de cada magnitud simple X_i , sin ponderarlos: (dado un agregado de magnitudes $X_1, X_2, X_3, \dots, X_i$.)

media aritmética:

$$I^t = \frac{\sum_{i=1}^N I_i^t}{N} = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{X_{it}}{X_{i0}}}{N}$$

media agregativa:

$$I_A^t = \frac{\sum_{i=1}^N X_{it}}{\sum_{i=1}^N X_{i0}}$$

En menor medida se usan también las medias geométricas y armónica.

Complejos **PONDERADOS :** se utiliza un promedio de índices simples de cada magnitud, X_i , ponderado cada uno de ellos por un peso w_i , distinto en cada caso.

media aritmética ponderada:

$$I^{*t} = \frac{\sum_{i=1}^N w_i I_i^t}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

media agregativa ponderada:

$$I_A^{*t} = \frac{\sum_{i=1}^N w_i X_{it}}{\sum_{i=1}^N w_i X_{i0}}$$

Números índices simples (precios, cantidades y valor):

Simplemente se trata de relativizar los precios, las cantidades o los valores respecto del año base.

Ejemplo: sean las siguientes cifras de producción y precios de ARROZ

y los correspondientes índices simples de precios ($\frac{p_t}{p_o}$), de cantidades ($\frac{q_t}{q_o}$) y de valores ($\frac{p_t \cdot q_t}{p_o \cdot q_o}$), con respecto al periodo base 0.

PERÍODO	PRECIO	CANTIDAD	VALOR	ÍNDICE PRECIOS (PREC.REL.)	ÍNDICE CANTIDADES (CANT.REL.)	ÍNDICE VALORES (VAL.REL.)
0	50	10	500	1	1	1
1	60	15	900	1,2	1,5	1,8
2	70	20	1400	1,4	2	2,8
3	75	30	2250	1,5	3	4,5
4	80	40	3200	1,6	4	6,4
5	90	50	4500	1,8	5	9

Números índices de precios.

Son números índices evaluados para magnitudes precios.

Índices de precios no ponderados: Dado un conjunto de artículos:

Índice de Sauerbeck: de precios es la media aritmética de los índices simples (de precios) de cada artículo:

$$S_p = \sum \frac{I_i^t}{N} = \frac{\sum P_{it}}{N P_{i0}}$$

Índice de Bradstreet-Dûtot : es la media agregativa de los precios:

$$BD_p = \frac{\sum P_{it}}{\sum P_{i0}}$$

Ejemplo: Obtener los índices de precios de Sauerbeck y de Bradstreet-Dûtot para el conjunto de productos agrícolas : Arroz, trigo y patatas:

	Arroz	Trigo	Patatas	Arroz	Trigo	Patatas	I.Sauerbeck	I.B-Dûtot
Periodo	Precio	Precio	Precio	I.Simple	I.Simple	I.Simple	(M-aritm.)	(M.agreg.)
0	50	30	40	1	1	1	1	1
1	60	30	40	1,2	1	1	1,066666666	1,083333333
2	70	35	45	1,4	1,1666	1,125	1,230555555	1,25
3	75	40	45	1,5	1,3333	1,125	1,319444444	1,333333333
4	80	45	50	1,6	1,5	1,25	1,45	1,458333333
5	90	50	50	1,8	1,6666	1,25	1,572222222	1,583333333

Índices de precios ponderados

Dependiendo de las ponderaciones para cada bien (o artículo) y del tipo de promedio que se utilice se podrán generar distintos índices:

Índice de Laspeyres : Es la media aritmética ponderada de los índices simples de cada artículo utilizándose como ponderación para cada bien: $w_i = p_{i0} \cdot q_{i0}$, esto es la ponderación para cada artículo será el valor de la cantidad consumida o vendida o producida del bien i-simo en el período base al precio del período base.

$$L_p = \frac{\sum w_i I_i^t}{\sum w_i} = \frac{\sum \frac{p_{it}}{p_{i0}} p_{i0} q_{i0}}{\sum p_{i0} q_{i0}} = \frac{\sum p_{it} q_{i0}}{\sum p_{i0} q_{i0}}$$

Índice de Pasche: Es la media aritmética ponderada de los índices simples de cada artículo utilizándose como ponderación para cada bien: $w_i = p_{i0} \cdot q_{it}$, esto es, el valor a precio del período base de la cantidad consumida en el período actual.

$$P_p = \frac{\sum w_i I_i^t}{\sum w_i} = \frac{\sum \frac{p_{it}}{p_{i0}} p_{i0} q_{it}}{\sum p_{i0} q_{it}} = \frac{\sum p_{it} q_{it}}{\sum p_{i0} q_{it}}$$

Índice de Fisher: Es simplemente la media geométrica de los dos anteriores.

$$F_p = \sqrt{L_p P_p} = \sqrt{\frac{(\sum p_{it} q_{it})(\sum p_{it} q_{i0})}{(\sum p_{i0} q_{it})(\sum p_{i0} q_{i0})}}$$

Índice de Edgeworth: Es la media agregativa ponderada de los índices simples de precios de cada artículo, utilizando como ponderación $w_i = q_{i0} + q_{it}$ Es decir, la suma de las

cantidades consumidas, producidas o vendidas de cada artículo en el año base y en el corriente :

$$E_p = \frac{\sum w_i p_{it}}{\sum w_i p_{i0t}} = \frac{\sum p_{it} (q_{it} + q_{i0})}{\sum p_{i0} (q_{it} + q_{i0})}$$

Ejemplo:



Ejemplo números índices ponderados

PERIODO	ARROZ			TRIGO			PATATAS		
	PRECIOS	CANT.	CANT.	PRECIOS	CANT.	CANT.	PRECIOS	CANT.	CANT.
0	50	10	10	30	10	10	40	10	10
1	60	15	15	30	10	10	40	15	15
2	70	20	20	35	15	15	45	15	15
3	75	30	30	40	15	15	45	15	15
4	80	40	40	45	20	20	50	20	20
5	90	50	50	50	20	20	50	25	25

INDICE DE LASPEYRES (M. ARIT. PONDERADA)

PERIODO	ARROZ			TRIGO			PATATAS		
	I. SIMPL	PONDERAC.	PONDERAC.	I. SIMPL	PONDERAC.	PONDERAC.	I. SIMPL	PONDERAC.	I. LASPEYRES
0	1	500	500	1	300	300	1	400	1
1	1,2	500	500	1	300	300	1	400	1,0833333333
2	1,4	500	500	1,16666667	300	300	1,125	400	1,25
3	1,5	500	500	1,33333333	300	300	1,125	400	1,3333333333
4	1,6	500	500	1,5	300	300	1,25	400	1,4583333333
5	1,8	500	500	1,66666667	300	300	1,25	400	1,5833333333

PERIODO	INDICE DE PASCHE						(M. ARIT. PONDERADA)	
	ARROZ		TRIGO		PATATAS		I. PASCHE	
	I. SIMPL	POND	I. SIMPL	POND	I. SIMPL	POND	I. SIMPL	POND
0	1	500	1	300	1	400	1	1
1	1,2	750	1	300	1	600	1,090909091	1,090909091
2	1,4	1000	1,66666667	450	1,125	600	1,378048788	1,378048788
3	1,5	1500	1,333333333	450	1,125	600	1,382352941	1,382352941
4	1,6	2000	1,5	600	1,25	800	1,5	1,5
5	1,8	2500	1,66666667	600	1,25	1000	1,646341468	1,646341468

I. FISHER

PERIODO	I. FISHER
0	1
1	1,0871146
2	1,3124637
3	1,3576219
4	1,4790199
5	1,6145301

INDICE DE EDGEWORTH (M. AGREG. PONDER.)

PERIODO	ARROZ		TRIGO		PATATAS		I. EDGEWORTH
	PRECIO	POND	PRECIO	POND	PRECIO	POND	
0	50	20	30	20	40	20	1
1	60	25	30	20	40	25	1,087719298
2	70	30	35	25	45	25	1,261538462
3	75	40	40	25	45	25	1,366666667
4	80	50	45	30	50	30	1,489130435
5	90	60	50	30	50	35	1,632075472

Propiedades de los números índices:

1. Existencia. Todo número índice ha de existir: Ha de tener un valor finito distinto de cero.
2. Identidad. Si se hacen coincidir el período base y el período actual el número índice debe ser 1.
3. Inversión. Si se intercambian el período base y el período actual los índices deben ser los valores recíprocos:

$$I_0 = 1 / I_t^0$$

4. Proporcionalidad. Si en el período actual todas las magnitudes sufren una variación proporcional, el número índice debe variar afectado por esta proporcionalidad.
5. Homogeneidad. Un número índice no debe quedar afectado por un cambio en las unidades de medida.

Cumplimiento de las propiedades por los índices de precios.

1. Existencia. La cumplen los seis.
2. Identidad. La cumplen los seis.
3. Inversión. Sólo la verifican los índices de Bradstreet-Dûtot, Edgeworth y Fisher.
4. Proporcionalidad. La satisfacen los seis, pero los resultados de una transformación proporcional son anómalos desde el punto de vista económico en el caso de los índices de Paasche, Edgeworth y Fisher, pues suponer que al variar los precios las cantidades se mantengan siempre constantes, es algo excesivo.
5. Homogeneidad. No la cumple ninguno.

En resumen: el índice de Bradstreet-Dûtot es el que más propiedades cumple, pero es un índice no ponderado, por lo que se suele preferir el índice de **Laspeyres** que es el único índice ponderado que cumple la proporcionalidad sin producir contrasentidos económicos.

Deflactación de series estadísticas

Si disponemos de una serie estadística de datos sobre la valoración de alguna magnitud económica (consumo , producción, etc),lo habitual es que la valoración monetaria de estos datos se realice a **precios corrientes** de cada período. En la medida en que los precios sufren alteraciones de unos períodos a otros, la serie así representada no permite hacer comparaciones.La solución de este problema es expresar la serie en términos de **precios constantes** de un determinado período (año base).

Es decir realizar la transformación:

Período	Valor nominal (ptas.corrientes)	Valor real (ptas. constantes)
0	$V_0 = \sum p_{i0} \cdot q_{i0}$	$V_0^R = \sum p_{i0} \cdot q_{i0}$
1	$V_1 = \sum p_{i1} \cdot q_{i1}$	$V_1^R = \sum p_{i0} \cdot q_{i1}$
.		
t	$V_t = \sum p_{it} \cdot q_{it}$	$V_t^R = \sum p_{i0} \cdot q_{it}$
.		
T	$V_T = \sum p_{iT} \cdot q_{iT}$	$V_T^R = \sum p_{i0} \cdot q_{iT}$

El paso de la serie original a la serie valorada en precios constantes se llama **deflactación**, y el índice a través del cual se puede pasar de una serie a la otra se llama **deflactor**.La deflactación de series es una de las utilidades importantes de los números índices.

Puede probarse que se si utiliza como deflactor el índice de precios de Laspeyres no se consigue el objetivo de obtener la valoración a precios constantes; sin embargo, si se utiliza el índice de **Paasche** sí se consigue cambiar la serie a valores constantes.

Cambio de base y empalme.

Otro problema que se plantea es la pérdida de representatividad de los índices al ir alejándonos del período base, especialmente cuando las ponderaciones utilizadas se refieren al período base .Este problema suele resolverse renovando cada cierto tiempo la evaluación de los índices, **cambiando de período base** .

Si se lleva a cabo una renovación del índice en un determinado período a partir de ese período se evaluarán los índices mediante otras ponderaciones y la serie quedará dividida en dos partes no homogéneas:

año	índice	año base
1985	1 (100)	1985
1986	1.15 (115)	1985
1987	1.25 (125)	1985
1988	1.39 (139)	1985
1989	1.60 (160)	1985
1990	1 (100)	1990
1991	1.2 (120)	1990
1992	1.3(130)	1990
1993	1.5 (150)	1990

La homogeneización de la serie se resuelve empalmado las dos series de forma que manteniendo el índice 100 (1) para el nuevo año base los índices anteriores mantengan la proporcionalidad .(Regla de tres).Para poder realizar el empalme es necesario conocer el índice del nuevo año base referido al antigua año base (en nuestro caso el índice de 1990 referido a 1985): supongamos que es 1.90 (190), entonces la serie homogénea sería:

año	empalme	índice
1985	$1 / 1.90 = 0.5263$	0.5263 (52.63)
1986	$1.15 / 1.90 = 0.6052$	0.6052 (60.52)
1987	$1.25 / 1.90 = 0.6578$	0.6578 (65.78)
1988	$1.39 / 1.90 = 0.7315$	0.7315(73.15)
1989	$1.60 / 1.90 = 0.8421$	0.8421 (84.21)
1990		1 (100)
1991		1.2 (120)
1992		1.3(130)
1993		1.5 (150)

Indicadores relevantes: I.P.C, I.Producción Industrial, Índices Bursátiles, Índices de comercio Exterior: ver:

Escuder,R.: "Métodos estadísticos aplicados a la Economía" Ariel.

Martín-Guzman,P y M.Pliego,J: "Curso Básico de Estadística".Ed. A.C.

Martín Pliego,F.J.: "Introducción a la Estadística Económica y Empresarial ".Ed. AC.