Ejercicios Tema 3: Metales Alcalinotérreos

(adaptada de: G. Rayner-Canham, T. Overton, *Descriptive Inorganic Chemistry*, 5th ed, W. H. Freeman and Co, 2010)

(adaptada de: T. W. Swaddle, *Inorganic Chemistry*, Academic Press, 1997)

(adaptada de: R. H. Petrucci, W. S. Harwood, G. E. Herring, *General Chemistry*, 8th ed, Prentice-Hall, 2002)

Prof. Responsable: **José María Moratal Mascarell**. Catedrático de Química Inorgánica (jose.m.moratal@uv.es)

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

1.- Escribe las ecuaciones químicas ajustadas para las siguientes reacciones:

a) calentar calcio con dióxigeno

b) adición de estroncio al agua

c) pasar dióxido de azufre sobre óxido de bario

d) calentar óxido de calcio con carbón a ~2000 °C

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

1.- Escribe las ecuaciones químicas ajustadas para las siguientes reacciones:

e) evaporación de una disolución acuosa de hidrogenocarbonato de calcio

f) calentar carbonato de calcio

g) calentar sulfato de calcio dihidratado

h) añadir agua al acetiluro de calcio

3

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

2.- El calcio cristaliza en una estructura cúbica compacta (o cúbica centrada en las caras).

a) Describe la estructura cúbica compacta, explica cuántos átomos de calcio hay en la celda unidad y determina el factor de ocupación de la celda unidad.

b) Calcula la longitud de la arista de la celda unidad y el radio metálico del calcio en pm.

Datos.- densidad del Ca = 1,55 g/cm³ ; A_r(Ca) = 40,1 ; N_A = 6,022·10²³ mol⁻¹ ; 1 pm = 10⁻¹² m.

• Solución:

■ a1) descripción de la celda

– 1 átomo en cada vértice y centro de caras del cubo

» (n. c. = 12)

– n° átomos celda = 8·(1/8) + 6(1/2) = 4

■ a2) factor de ocupación (%)

– f = [4·(4/3)πr³/a³] · 100

– 4·r = diagonal cara cubo ; (4r)² = 2a²

– 4·r = a·(2)^{1/2}

– f = (2)^{1/2}(π/6)·100 = 74 ; f = 74%

4

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

2.- El calcio cristaliza en una estructura cúbica compacta (o cúbica centrada en las caras).

b) Calcula la longitud de la arista de la celda unidad y el radio metálico del calcio en pm.

Datos.- densidad del Ca = $1,55 \text{ g/cm}^3$; $A_r(\text{Ca}) = 40,1$; $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$.

• **Solución:**

▪ **b1) longitud de la arista de la celda**

- volumen celda = masa celda/densidad;
- n° átomos celda = 4
- masa celda = $4(40,1) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} / 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- masa celda = $26,63567 \cdot 10^{-23} \text{ g}$
- volumen celda = $26,636 \cdot 10^{-23} \text{ g} / 1,55 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 17,1843 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3$
- $V = a^3$; arista celda = $5,5596 \cdot 10^{-8} \text{ cm} \equiv 555,96 \text{ pm}$

▪ **b2) radio del átomo de calcio**

- $d = \text{diagonal cara} = 4r$; $d^2 = 2 a^2$
- $(4r)^2 = 2 a^2$; $r = (a/4) \sqrt{2}$; $r = (555,96/4) \sqrt{2} = 196,56 \text{ pm}$
- $r(\text{Ca}) = 196,56 \text{ pm}$

5

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

3.- Del análisis comparado de los puntos de fusión de los compuestos de berilio, magnesio y calcio que se indican en la tabla, explica razonadamente el tipo de enlace en dichos compuestos.

p. f. (°C) de compuestos de berilio, magnesio y calcio

	MO	MF ₂	MCl ₂
$M = \text{Be}$	2578	552	415
$M = \text{Mg}$	2825	1263	714
$M = \text{Ca}$	2613	1418	775

densidad de carga de los iones alcalinotérreos

ión	Densidad de carga ($\text{C} \cdot \text{mm}^{-3}$)
Be ²⁺	1100
Mg ²⁺	120
Ca ²⁺	52
Sr ²⁺	33
Ba ²⁺	23

• **Solución:**

- El poder polarizante de los iones M²⁺ disminuye al aumentar el radio iónico:
  - mientras que el Ca²⁺ sería poco polarizante, el Be²⁺ será muy polarizante, y el Mg²⁺ moderadamente polarizante
- por lo tanto, los haluros y el óxido de calcio se pueden considerar como iónicos
- en el caso del magnesio, algo más polarizante, aún se pueden considerar esencialmente iónicos aunque en el cloruro el enlace tendría algo de componente covalente.

6

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

3.- Del análisis comparado de los puntos de fusión de los compuestos de berilio, magnesio y calcio que se indican en la tabla, explica razonadamente el tipo de enlace en dichos compuestos.

p. f. (°C) de compuestos de berilio, magnesio y calcio

	MO	MF ₂	MCl ₂
M = Be	2578	552	415
M = Mg	2825	1263	714
M = Ca	2613	1418	775

• **Solución:**

- En el caso del berilio, observamos que los p. f. de ambos haluros son menores que los de magnesio y además son bajos para ser compuestos iónicos
  - por lo tanto, en el Be²⁺ mucho más polarizante debido a su pequeño radio iónico, tanto en el cloruro como en el fluoruro el enlace es intermedio, [iónico con fuerte componente covalente (de acuerdo con sus menores p. f.'s)].
- como el anión óxido es más polarizable que el fluoruro, el enlace en BeO será más covalente (menos iónico) que en el fluoruro, es decir BeO es un compuesto de red covalente con enlace *covalente-polarizado*

7

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

4.- Calcula ΔG° para la formación de escayola a partir del yeso. Determina a partir de qué temperatura la reacción será espontánea.

Datos.- $\Delta H_f^\circ(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$: $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = -286$; $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = -242$; $\text{CaSO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s}) = -2023$,
 $\text{CaSO}_4\cdot 1/2\text{H}_2\text{O}(\text{s}) = -1577$;

$S^\circ(\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})$: $\text{CaSO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s}) = 194$; $\text{CaSO}_4\cdot 1/2\text{H}_2\text{O}(\text{s}) = 131$; $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = 70$; $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = 189$.

• **Solución:**

$$\Delta H_r^\circ = -1577 + (3/2)(-286) - (-2023) = +17 \text{ kJ}$$

$$\Delta S_r^\circ = 131 + 3/2(70) - 194 = 42 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta G_r^\circ = 17 - 298(42 \cdot 10^{-3}) = +4,484 \text{ kJ} \quad \text{no espontánea}$$

$$T > \Delta H / \Delta S = 17 / 0,042 = 404,76 \text{ K} \cong 131,76 \text{ }^\circ\text{C}$$

como $T > 100 \text{ }^\circ\text{C}$, reescribimos la reacción ya que el agua se encontrará como $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

8

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

4.- Calcula ΔG° para la formación de escayola a partir del yeso. Determina a partir de qué temperatura la reacción será espontánea.

Datos.- $\Delta H_f^\circ(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$: $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = -286$; $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = -242$; $\text{CaSO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s}) = -2023$,
 $\text{CaSO}_4\cdot 1/2\text{H}_2\text{O}(\text{s}) = -1577$;

$S^\circ(\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})$: $\text{CaSO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s}) = 194$; $\text{CaSO}_4\cdot 1/2\text{H}_2\text{O}(\text{s}) = 131$; $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = 70$; $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = 189$.

• **Solución:**

$$\Delta H_r^\circ = -1577 + (3/2)(-242) - (-2023) = +83 \text{ kJ}$$

$$\Delta S_r^\circ = 131 + 3/2(189) - (194) = 220,5 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta G_r^\circ = 83 - 298(220,5 \cdot 10^{-3}) = +17,291 \text{ kJ}$$

$$T > \Delta H / \Delta S = 83 / 0,2205 = 376,4 \text{ K}; \quad T > 103,4^\circ\text{C}$$

reacción espontánea para $T > 103,4^\circ\text{C}$

9

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

5.- De las siguientes especies gaseosas, BeH , BeH^+ y BeH^- , explica cuál será la más estable y si alguna de ellas no debería existir.

• **Solución:**

- BeH OE = 0,5
- BeH^+ OE = 1
- BeH^- OE = 0
- a) más estable BeH^+
  - OE = 1
- b) no debe existir BeH^-
  - OE = 0

10

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

6.- Explica por qué en disolución acuosa el ión magnesio se representa por $Mg(H_2O)_6^{2+}$ mientras que el ión berilio se representa como $Be(H_2O)_4^{2+}$

• **Solución:**

- Aunque los números de hidratación de los iones metálicos suelen ser 6, el ión Be^{2+} es demasiado pequeño para acomodar 6 moléculas de H_2O en su entorno inmediato

7.- Una forma de paliar el efecto de la lluvia ácida sobre los lagos es mediante la adición de caliza. Sin embargo, tal adición puede reducir la disponibilidad del ión fosfato, un nutriente importante; escribe la correspondiente reacción ajustada y calcula ΔG° .

Datos.- $\Delta H_f^\circ(kJ \cdot mol^{-1})$: $CaCO_3(s) = -1207$; $Ca_3(PO_4)_2(s) = -4121$; $PO_4^{3-}(ac) = -1277$;
 $CO_3^{2-}(ac) = -675$.

$S^\circ(J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$: $CaCO_3(s) = +93$; $Ca_3(PO_4)_2(s) = +236$; $PO_4^{3-}(ac) = -220$; $CO_3^{2-}(ac) = -50$.

• **Solución:**

$$\Delta H_r^\circ = -4121 + 3(-675) - [3(-1207) + 2(-1277)] = 29 \text{ kJ}$$

$$\Delta S_r^\circ = 236 + 3(-50) - [3(93) + 2(-220)] = 247 \text{ J} \cdot K^{-1}$$

$$\Delta G_r^\circ = 29 - 298(247 \cdot 10^{-3}) = -44,61 \text{ kJ} \quad \text{espontánea}$$

11

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

8.- En la extinción de un incendio en el que está ardiendo magnesio ¿podrías utilizar los medios convencionales (H_2O o CO_2) para extinguir dicho incendio? Utiliza el diagrama de Ellingham para apoyar tus argumentos y escribe las reacciones ajustadas correspondientes.

• **Solución:**

- Según el diagrama de Ellingham el MgO es más estable que H_2O y que CO_2 . Por lo tanto el Mg reducirá tanto al H_2O como al CO_2 :

- En ambos casos se genera además un combustible (que avivará el fuego) pero ....

– *particularmente peligroso si se utiliza agua ya que se producirán explosiones debido a que se genera $H_2(g)$*

12

Facultat
de Química

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

Ejercicios adicionales

<https://www.uv.es/moratal/>

13

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

9.- Escribe las ecuaciones químicas ajustadas para las siguientes reacciones:

14

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

9.- Escribe las ecuaciones químicas ajustadas para las siguientes reacciones:

h) calentar a alta temperatura óxido de bario con aluminio

i) se calienta acetiluro de calcio con nitrógeno en un horno eléctrico a 1100°C

15

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

10.- El estroncio cristaliza en una estructura cúbica compacta (o cúbica centrada en las caras).
Determina la densidad del estroncio, en g/cm³.

Datos.- masa atómica relativa del estroncio, $A_r = 87,62$; radio atómico del estroncio = 215 pm;
1 pm = 10⁻¹² m; $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

• Solución:

▪ densidad = masa celda/volumen celda;

– n° átomos celda = $8 \cdot (1/8) + 6(1/2) = 4$

▪ masa celda = $4(A_r) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} / 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

– masa celda = $4(87,62) / 6,022 \cdot 10^{23} = 58,1999 \cdot 10^{-23} \text{ g}$

▪ d = diagonal cara = 4r; $(4r)^2 = 2 a^2$; $a = 4r/\sqrt{2}$;

▪ $a = (4 \cdot 215) / \sqrt{2} = 608,11 \text{ pm} \equiv 6,0811 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$

– volumen celda = $a^3 = 22,488 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3$

▪ $d = m / V = 58,2 \cdot 10^{-23} \text{ g} / 22,488 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3 = 2,588 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

16

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

11.- a) Explica por qué las sales sólidas de magnesio suelen tener alto grado de hidratación. b) El hidrato común del sulfato de magnesio es el heptahidrato, $MgSO_4 \cdot 7H_2O$, sal de Epsom, ¿cuántas moléculas de agua están probablemente asociadas al catión en su estructura cristalina?

• **Solución:**

- a) sales de los iones alcalinotérreos M^{2+} suelen estar hidratadas
  - cuanto mayor es la densidad de carga del catión mayor es el n° de moléculas de H_2O polares atraídas; el Mg^{2+} es el más polarizante del grupo 2 (con excepción del berilio)
  - de hecho el n° de hidratación disminuye de $Mg^{2+} \rightarrow Ba^{2+}$ (al disminuir la densidad de carga)
- b) los números de hidratación de los iones metálicos suelen ser 6 (excepto para iones muy pequeños como Be^{2+} que es 4)

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

12.- a) Explica por qué de los compuestos de los elementos alcalinotérreos son los de berilio los que presentan enlace con mayor carácter covalente, b) ¿por qué el berilio no reacciona con el agua?

• **Solución:**

- a) ¿tendencia a formar enlaces covalentes?
  - mayor en berilio
    - » elevada densidad de carga de Be^{2+} (y mayor χ)
- b) tanto el Be como Mg se pasivan con una capa de óxido insoluble
  - no obstante el Mg reacciona, aunque lentamente, con el agua en caliente

Valores de χ de los elementos alcalinotérreos y densidad de carga de sus iones.

Ión	Densidad de carga ($C \cdot mm^{-3}$)	χ
Be^{2+}	1100	1,5
Mg^{2+}	120	1,2
Ca^{2+}	52	1,0
Sr^{2+}	33	1,0
Ba^{2+}	23	0,9

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

13.- Utilizando el diagrama de Ellingham que se adjunta (abcisa en grados centígrados) responde razonadamente: ¿por qué la línea $\Delta G^\circ - T$ del óxido de calcio presenta un cambio de pendiente a $\sim 850^\circ\text{C}$ y otro cambio aún más acentuado a $\sim 1500^\circ\text{C}$?

• **Solución:**

– por lo tanto la pendiente de la representación $\Delta G^\circ - T$ será positiva, ya que la pendiente es $-\Delta S_r^\circ$

» $\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - \Delta S_r^\circ T = \Delta H_r^\circ + (-\Delta S_r^\circ) T$

■ si a $\sim 850^\circ\text{C}$ la pendiente aumenta (ligeramente) será porque la ΔS_r° se ha hecho más negativa, lo cual implica que ha aumentado la entropía de los reactivos, es decir el $\text{Ca}(s)$ se ha fundido $\rightarrow \text{Ca}(l)$

■ por el mismo razonamiento, el aumento más pronunciado de la pendiente a $\sim 1500^\circ\text{C}$ corresponde al cambio de fase $\text{Ca}(l) \rightarrow \text{Ca}(g)$

(adaptada de: G. Rayner-Canham, *Química Inorgánica Descriptiva*, 2ª ed, Pearson Educación, 2000)

19

Ejercicios Tema 3. Metales Alcalinotérreos

14.- Explica esquemáticamente como se forman las cavernas en los suelos kársticos (calizos)

• **Solución:**

■ **Formación de cavernas en los suelos kársticos (calizos)**

– lechos de piedra caliza + agua de lluvia (contiene CO_2)

– óxido ácido reacciona con CaCO_3

– $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ más soluble que CaCO_3

– la disolución se va escurriendo

» se origina un hueco en la roca

» con el tiempo una caverna

(adaptada de: R. H. Petrucci, W. S. Harwood, G. E. Herring, *General Chemistry*, 8ª ed, Prentice-Hall, 2002)

20