

RED PRELIMINAR DE ÁREAS IMPORTANTES PARA LOS BRIÓFITOS: IBrA Secundarias

NÚMERO IBRA: 28

DENOMINACIÓN: CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS

Área biogeográfica: Mediterránea.

Comunidad Autónoma: Cataluña.

Provincia: Barcelona / Lleida.

Topónimos de referencia: Castellfollit de Riubregós, Tora de Riubregós, Sanahuja, Biosca, Ponts, Plandogao.

Protección: La parte occidental de esta IBrA está incluida en el PEIN "Vall del riu Llobregós". Sin embargo, este PEIN no comprende la zona más interesante desde el punto de vista briológico, que corresponde a la parte alta u oriental del río.

Descripción:

El valle del río Llobregós comprende la zona rica en yesos más importante de Cataluña. La vegetación dominante corresponde a carrascales y robledales secos de *Quercus faginea*. Actualmente el paisaje está dominado por campos de cultivo de secano y por tomillares gipsícolas continentales.

La zona, que va entre los 380 y los 500 m de altitud, acoge briófitos propios de suelos yesosos o calcáreos bajo climas áridos. Predominan musgos de la familia Pottiaceae como *Acaulon casasianum* (NT), *Microbryum curvicollum*, *Tortula vlasovii* (VU), *Protobryum bryoides*, *Pterygoneurum ovatum*, *Syntrichia caninervis*, *Tortella inclinata*, *Tortula brevissima*, etc. La única hepática que se ha recolectado en estos suelos es *Riccia crustata* (VU en la Lista Europea ECCB 1995).

Fuentes y bibliografía:

Brugués, M., R.M. Cros & F. Lloret 1993. Dades per a la brioflora dels guixos de Catalunya. *Orsis* 8: 147-149.

European Committee for the Conservation of Bryophytes (ECCB) (ed.) (1995) *Red Data Book of European bryophytes*. Trondheim: ECCB.

Preparado por: M. Brugués.

Infante, M. & P. Heras 2012. Red preliminar de Áreas Importantes para los Briófitos (IBrA). En: Garilleti, R. & B. Albertos (Coords.). *Atlas de los briófitos amenazados de España*. Universitat de València. <http://www.uv.es/abraesp>. Publicado en línea el 30/05/2012.