

RED PRELIMINAR DE ÁREAS IMPORTANTES PARA LOS BRIÓFITOS: IBrA Secundarias

NÚMERO IBRA: 39

DENOMINACIÓN: SIERRA ALHAMILLA

Área biogeográfica: Mediterránea.

Comunidad Autónoma: Andalucía.

Provincia: Almería.

Topónimos de referencia: Níjar, Tabernas.

Protección: Paraje Natural de Sierra Alhamilla.

Descripción:

El encinar de Sierra Alhamilla se encuentra en una isla biogeográfica y boscosa donde se alcanzan precipitaciones de 400 mm anuales, en un entorno donde no se superan los 200 mm (desierto de Tabernas y Campos de Níjar), mientras que la amplitud térmica oscila entre los 5° y 22° C, en comparación a los 11°-27° C de los alrededores. Entre los 800 y 1.300 m de altitud se desarrolla un encinar (*Quercus ilex* subsp. *ballota*), que destaca por la riqueza de su brioflora epífita, que asciende a 42 táxones.

Entre ellos, hay que destacar que sólo uno es una hepática, la extendida y abundante *Frullania dilatata*, que sin embargo en este entorno se convierte en una excepción. Dos *Orthotrichum* (*O. scanicum* y *O. philibertii*) están catalogados como Vulnerables, y un tercero, *O. ibericum*, figura en la categoría de Atención (LC-att). Por otra parte, están también presentes *Orthotrichum speciosum* var. *brevisetum* y *Zygodon catarinói*, táxones descritos hace poco tiempo; mientras que cabe destacar *O. tortidontium* y *O. vittii* por su significado biogeográfico, al ser táxones de distribución circunmediterránea.

Fuentes y bibliografía:

Medina, N.G., R. Medina, F. Lara & V. Mazimpaka 2008. Brioflora epífita de Sierra Alhamilla (Almería). *Boletín de la Sociedad Española de Briología* 32/33: 1-7.

Preparado por: M. Infante & P. Heras.

Infante, M. & P. Heras 2012. Red preliminar de Áreas Importantes para los Briófitos (IBrA). En: Garilleti, R. & B. Albertos (Coords.). *Atlas de los briófitos amenazados de España*. Universitat de València. <http://www.uv.es/abraesp>. Publicado en línea el 30/05/2012.