



SIN DIGERIR 2

Consumidor y consumidos: Egagrópilas de rapaces y microvertebrados fósiles (SinDigerir2)

Organizan:



Esqueleto craneal



Cráneo



Hemimandíbula




Incisivo superior




Incisivo inferior

Diferenciación entre el esmalte y la dentina



Incisivo superior



Esqueleto craneal



Múridos (ratas y ratones)

Cúspides bajas,
redondeadas



M3

M2

M1



m3




m2



m1

Molares superiores

Molares inferiores



Esqueleto craneal

Arvicolídeos (topillos, lemmings y ratas de agua)

Cúspides altas, superficie de masticación (oclusal) plana



M₁



M³



Esqueleto craneal

Insectívoros (topos y musarañas)

Cúspides bajas, puntiagudas




Incisivo Superior



Primer/Segundo
molar superior



Incisivo inferior



Primer/Segundo
molar inferior



Esqueleto craneal


Denticiones y dietas

Múridos



**Dieta
omnívora**


Arvicólidos



**Dieta
abrasiva**





Insectívoros



**Dieta
dura**




Esqueleto poscraneal



Húmero



Ulna (cúbito)



Escápula
(Omóplato)

Vértebras

Vértebra cervicales, torácicas y lumbares

Vértebra caudal



Craneal

Hemimandíbulas



Roedor



Insectívoro

Huesos largos



Húmero



Fémur



Radio



Ulna



Tibia-fíbula

AVES



Húmero



Tarso



Astrágalo




Calcáneo



Falange



Metápodo



Costilla



Escápula



Coxal