

- 1) A partir del hecho de que las notas de cierta asignatura, de una misma titulación en dos ciudades A y B, siguen una distribución normal con variancias: $\sigma^2_A=4$; $\sigma^2_B=3$ y que se desea estimar la diferencia entre las medias de la asignatura en las dos localidades, se consideran dos muestras independientes formadas por las notas de 28 alumnos de A y 29 alumnos de B obteniéndose que las medias son, respectivamente, 7 y 6. Se debe realizar la estimación con un 95% de confianza.

$$n_A = 28 \quad n_B = 29 \quad \bar{x}_A = 7 \quad \bar{x}_B = 6 \quad 1 - \alpha = 0,95$$

NORMALES

Varianzas conocidas $\sigma^2_A=4$; $\sigma^2_B=3$

así intervalo de diferencias de medias


$$\frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}} \rightarrow N[0,1]$$

$$P\left((\bar{x} - \bar{y}) - \lambda_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}} \leq (\mu_x - \mu_y) \leq (\bar{x} - \bar{y}) + \lambda_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}\right) = 1 - \alpha$$

X=A e Y=B

$$P\left(1 - 1,96 \sqrt{\frac{4}{28} + \frac{3}{29}} \leq (\mu_A - \mu_B) \leq 1 + 1,96 \sqrt{\frac{4}{28} + \frac{3}{29}}\right) = 0,95$$

$$P(0,027269 \leq (\mu_A - \mu_B) \leq 1,972731) = 0,95$$



Lamda alfa medios será

- 2) Para estimar la varianza del índice de cotización de una moneda respecto al €, se ha tomado una muestra de 5 días al azar que daba la siguiente cotización: 3'2; 3'18; 3'22; 3'25; 3'25.
- a) Supuestamente normal aquella cotización, obtener al 90% de confianza un intervalo para la varianza.
- b) Plantear el problema anterior, suponiendo conocida la media de índices de cotización e igual a 3'24.

calculamos media y varianza muestral


X	X ²		
3,2	10,24		
3,18	10,1124		
3,22	10,3684		
3,25	10,5625		
3,25	10,5625		
16,1	51,8458		
media =	3,22	↳ 2	10,36916
varianza=	0=10,36916- 3,22 ²		0,00076

a) sabemos que es normal y media desconocida luego

$T = \frac{nS^2}{\sigma^2} \rightarrow \chi_{n-1}^2$ valores de la CHI2 **con 4 grados** de libertad con nivel de confianza 0,9

$$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 = \chi_{0,95}^2 = 9,488$$

$$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2 = \chi_{0,05}^2 = 0,7111$$



$$\text{luego } T = \frac{nS^2}{\sigma^2} \rightarrow \begin{matrix} \leq 9,488 \\ \geq 0,711 \end{matrix} \quad \text{despejando} \quad \begin{matrix} \frac{nS^2}{9,488} \leq \sigma^2 \\ \frac{nS^2}{0,7111} \geq \sigma^2 \end{matrix}$$

$$\frac{nS^2}{9,488} = \frac{0,0038}{9,488} = 0,0004 \leq \sigma^2$$

$$\frac{nS^2}{0,7111} = \frac{0,0038}{0,7111} = 0,00534 \geq \sigma^2$$

$$\text{luego} \quad P(0,0004 \leq \sigma^2 \leq 0,00534) = 0,9$$


b) sabemos que es Normal y que la media la conocemos y vale 3,24

trabajaremos con $gl = n-1 = 4$ y

$$T = \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \rightarrow \chi_n^2 \quad \text{donde} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n} \quad \text{es decir el cálculo de la varianza en base a los valores muestrales y la media "conocida"}$$

varianza estimada = 0,00116 dado que :

X	x-3,24	(x-3,24) ²
3,2	-0,04	0,0016
3,18	-0,06	0,0036
3,22	-0,02	0,0004
3,25	0,01	1E-04
3,25	0,01	1E-04
suma = 16,1		0,0058
media = ahora 3,24		
varianza=0,0058/5	0,00116	



$$T = \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \rightarrow \begin{matrix} \leq 11,07 \\ \geq 1,145 \end{matrix}$$

despejando

$$\begin{aligned} \frac{n\hat{\sigma}^2}{11,07} &\leq \sigma^2 \\ \frac{n\hat{\sigma}^2}{1,145} &\geq \sigma^2 \\ \frac{n\hat{\sigma}^2}{11,07} &= \frac{0,0058}{11,07} = 0,00052 \leq \sigma^2 \\ \frac{n\hat{\sigma}^2}{1,145} &= \frac{0,0058}{1,145} = 0,00506 \geq \sigma^2 \end{aligned}$$

luego $P(0,00052 \leq \sigma^2 \leq 0,00506) = 0,9$

- 3) A partir del hecho de que las notas de cierta asignatura, de una misma titulación en dos ciudades A y B, siguen una distribución normal con variancias: $S^2_A=4$; $S^2_B=3$ y que se desea estimar la diferencia entre las medias de la asignatura en las dos localidades, se consideran dos muestras independientes formadas por las notas de 28 alumnos de A y 29 alumnos de B obteniéndose que las medias son, respectivamente, 7 y 6. Se debe realizar la estimación con un 95% de confianza.

$$n_A = 28 \quad n_B = 29 \quad \bar{x}_A = 7 \quad \bar{x}_B = 6 \quad 1 - \alpha = 0,95$$

NORMALES

Varianzas desconocidas pero iguales $\sigma^2_A = \sigma^2_B$

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{n_X + n_Y} \cdot \sqrt{n_X S_X^2 + n_Y S_Y^2}} \cdot \sqrt{n_X n_Y} \cdot \sqrt{n_X + n_Y - 2} \sim t_{n_X + n_Y - 2}$$

$$\frac{7 - 6 - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{28 + 29} \cdot \sqrt{28 \cdot 4 + 29 \cdot 3}} \cdot \sqrt{28 \cdot 29} \cdot \sqrt{28 + 29 - 2} \sim t_{28 + 29 - 2}$$

$$\frac{1 - (\mu_X - \mu_Y)}{7,54 \cdot 14,10} \cdot 28,49 \cdot 7,41 \sim t_{53}$$

$$\frac{1 - (\mu_X - \mu_Y)}{106,314} \cdot 211,11 = (1 - (\mu_X - \mu_Y)) \cdot 1,9857 \sim t_{53}$$

$$T = \begin{matrix} \geq -2,006 \\ \leq 2,006 \end{matrix} \quad \text{valores de t al final por aproximación normal o caest}$$

$$1,9857 - 1,9857(\mu_x - \mu_y) = \begin{matrix} \geq -2,006 \\ \leq 2,006 \end{matrix}$$

$$-1,9857(\mu_x - \mu_y) = \begin{matrix} \geq -2,006 - 1,9857 = -3,9917 \\ \leq 2,006 - 1,9857 = 0,0203 \end{matrix}$$

$$(\mu_x - \mu_y) = \begin{matrix} \leq -\frac{3,9917}{-1,9857} = 2,01 \\ \geq \frac{0,0203}{-1,9857} = -0,01 \end{matrix}$$

$$\text{luego } P(-0,01 \leq (\mu_x - \mu_y) \leq 2,01) = 0,95$$